

第七章 中药的剂量与用法

习题

一、A型题

- 1.入汤剂需先煎的药物是（ ）
A.薄荷、白豆蔻 B.蒲黄、海金沙 C.人参、阿胶
D.磁石、牡蛎 E.以上均不是
- 2.入汤剂需后下的药物是（ ）
A.磁石、牡蛎 B.蒲黄、海金沙 C.薄荷、白豆蔻一
D.人参、鹿茸 E.芒硝、阿胶
- 3.蒲黄、旋覆花等药入煎剂宜（ ）
A.包煎 B.后下 C.先煎
D.烊化 E.冲服
- 4.宜饭后服用的药是（ ）
A.峻下逐水药 B.对胃肠有刺激性的药C.驱虫药
D.安神药 E.截疟药
- 5.中药传统的给药途径是（ ）
A.舌下给药 B.直肠给药 C.口服和皮肤给药
D.黏膜表面给药 E.吸入给药

二、B型题

- | | | |
|------|------|------|
| A.先煎 | B.后下 | C.包煎 |
| D.另煎 | E.烊化 | |
- 1.钩藤入汤剂宜（ ）
 - 2.西洋参入汤剂宜（ ）
A.先煎 B.后下 C.包煎
D.另煎 E.冲服
 - 3.细小而含黏液质多的种子类药入汤剂宜（ ）
 - 4.贝壳类药入汤剂宜（ ）

三、C型题

- | | | | |
|------|------|--------|---------|
| A.先煎 | B.包煎 | C.二者均是 | D.二者均不是 |
|------|------|--------|---------|
- 1.车前子入汤剂宜（ ）
 - 2.砂仁入汤剂宜（ ）
A.烊化 B.冲服 C.二者均是 D.二者均不是
 - 3.鹿角胶服用应（ ）
 - 4.雷丸服用应（ ）

四、X型题

- 1.临床上确定中药用量的主要依据是（ ）

- A.服药的季节 B.所用药物的性质 C.患者年龄、体质、病情
D.剂型 E 配伍
- 2.宜冲服的药物是（ ）
A.矿物药 B.胶类药物 C.芳香药
D.汁液性药 E.贵重药
- 3.煎药器具最宜选用（ ）
A.砂锅 B.瓦罐 C.铁锅
D.不锈钢锅 E.铝锅

参考答案

一、A 型题

- 1.D.上述药物中，磁石、牡蛎为有效成分难溶于水的矿物、介壳类药物，应打碎先煎，煮沸 20~30 分钟后，再下其他药物同煎，以使有效成分充分溶出，故答案应选 D。
- 2.C.上述药物中，薄荷、白豆蔻属气味芳香的药物，久煎其有效成分易于挥发而降低药效，须在其他药物煎煮将成时放入，煎沸 3~5 分钟即可，故答案应选 C。
- 3.A.蒲黄为花粉入药，质轻，煎煮时易漂浮于药液表面，或成糊状，不便于煎煮及服用；旋覆花为花序入药，带有绒毛，易刺激咽喉引起咳嗽，故两药入煎剂时宜先用纱布袋装好，再与其他药物同煎，故答案应选 A。
- 4.B.饭前还是饭后服药主要决定于病变部位和性质，对胃肠有刺激性的药物宜饭后服用，故答案应选 B；此外，峻下逐水药宜晨起空腹服药，驱虫药宜饭前服用，安神药宜睡前服用，截疟药应在疟疾发作前两小时服药。
- 5.C.中药传统的给药途径是口服和皮肤给药，故答案应选 C.舌下给药、直肠给药、黏膜表面给药、吸入给药都属于现代给药途径。

二、B 型题

- 1.B2.D.钩藤久煎易破坏其有效成分，应后下，故第 1 题答案应选 B.西洋参属贵重药材，为了更好地煎出有效成分，应单独另煎，即另炖 2~3 小时，故第 2.题答案应选 D。
- 3.C4.A.细小而含黏液质多的种子类药，煎煮时容易粘锅，引起焦化或糊化，入汤剂宜布包煎，故第 3 题答案应选 C.贝壳类药物，质地坚硬，应打碎先煎，煮沸 20~30 分钟后，再下其他药物同煎，以使有效成分充分析出，故第 4 题答案应选 A。

三、C 型题

- 1.B2.D.车前子为细小的种子入药，易刺激咽喉，且含黏液质较多，煎煮时容易粘锅，引起焦化或糊化，入汤剂宜布包煎，故第 1 题答案应选 B.砂仁气味芳香，入汤剂宜后下，以防有效成分挥发，故第 2 题答案应选 D。
- 3.A4.B.胶类药物为了避免入煎粘锅，可单用水或黄酒将其加热熔化即烊化后，用煎好的药液冲服，故第 3 题答案应选 A.雷丸有效成分几乎不溶于水，遇热易被破坏，应做成散剂冲服，故第 4 题答案应选 B。

四、X 型题

1.ABCDE.一般来讲，确定中药的剂量，应考虑到药物性质、剂型、配伍、年龄、体质、病情及季节变化等方面的因素，故答案应选 ABCDE.

2.DE.某些贵重药和汁液性药宜冲服，故答案应选 DE.而矿物药宜先煎，胶类药宜烊化，芳香药宜后下。

3.AB.煎药用具以砂锅、瓦罐为好，搪瓷罐次之，忌用铜铁锅，以免发生化学反应，影响疗效，故答案应选 AB.