

历年真题试卷（七）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 2 分，共 240 分）。

1. 对一位即将分娩的孕妇，住院处护理人员首先要做的是
A. 测生命体征 B. 进行卫生处理 C. 进行护理评估
D. 立即护送入病区 E. 通知病区做好抢救准备
2. 骨折病人发生关节僵硬的主要原因是
A. 关节面骨折 B. 合并神经损伤 C. 合并血管损伤
D. 肌肉嵌入骨断端 E. 缺乏功能锻炼
3. 关于紫外线消毒，下列哪项是错误的
A. 因紫外线穿透性差，故被消毒的物品不可有任何遮蔽
B. 为检查紫外线杀菌效果需定期进行空气细菌培养
C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
D. 照射前，病室应先做好清洁工作
E. 灯管使用期限，不能超过 3000 小时
4. 患者，男，35 岁，炼钢工人，工作中不慎被烧伤，烧伤面积达 70%，应采取
A. 严密隔离 B. 呼吸道隔离 C. 消化道隔离
D. 接触性隔离 E. 保护性隔离
5. 发生压疮的最主要的原因是
A. 局部组织受压过久 B. 病原微生物侵入皮肤组织 C. 机体营养不良
D. 皮肤过敏反应 E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激
6. 检查某患者右下肢时，可见肢体在床面上移动位置但不能抬起，其肌力为
A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级
D. 4 级 E. 5 级
7. 软组织损伤 48h 内应采用的处理方法是
A. 热疗法 B. 冷疗法 C. 冷、热疗法反复交替使用
D. 先用冷疗法，后用热疗法 E. 先用热疗法，再用冷疗法
8. 急腹症在诊断未明了时，禁忌使用热疗的原因是
A. 可使体温升高 B. 可引起反射性的冠状动脉收缩 C. 导致腹泻
D. 妨碍炎症吸收 E. 可掩盖病情
9. 鼻周围三角区感染化脓忌用热敷的主要原因是
A. 可加重疼痛 B. 可加重局部出血 C. 可掩盖病情，难以诊断
D. 导致颅内感染 E. 导致面部皮肤烫伤
10. 为患者鼻饲时，其胃管插入的深度为
A. 40~55cm B. 45~50cm C. 45~55cm
D. 42~49cm E. 45~65cm
11. 关于排便性质异常，错误的描述是

- A.上消化道出血时粪便为柏油样
B.胆管完全阻塞时粪便为陶土色
C.消化不良者大便呈酸臭味
D.痔疮出血在排便后有鲜血滴出
E.痢疾患者粪便呈黏液血便
- 12.对便秘患者进行健康指导时，哪种做法不妥
A.生活规律，定时排便
B.病情许可时，协助下床活动
C.多食富有粗纤维的食物
D.摄取适量油脂食物
E.每晚睡前使用开塞露
- 13.关于病室湿度错误的说法是
A.湿度过低对气管切开患者不利
B.湿度过高加重患者肾脏的负担
C.湿度过高可抑制出汗
D.湿度过高利于细菌繁殖
E.应保持病室湿度在 30%~40%之间
- 14.下列关于通风目的的叙述错误的是
A.增加患者的舒适感
B.保持室内空气新鲜
C.减少室内细菌含量
D.增加汗液蒸发及热的散失
E.避免噪声刺激
- 15.不需应用保护具的患者是
A.高温患者
B.昏迷患者
C.躁动患者
D.体温过低患者
E.谵妄患者
- 16.紫外线最佳杀菌波长为
A.225nm
B.245nm
C.254nm
D.325nm
E.454nm
- 17.患者，女，32岁，因甲型肝炎收入院治疗，应采取的隔离是
A.严密隔离
B.消化道隔离
C.呼吸道隔离
D.接触性隔离
E.保护性隔离
- 18.正常人一般不易引起口腔感染，是由于唾液中含有
A.游离酸
B.脂肪酶
C.溶菌酶
D.淀粉酶
E.乳糖酶
- 19.在身体空隙处垫以软枕的作用是
A.固定体位
B.降低局部皮肤所承受的压力
C.减少皮肤受摩擦的刺激
D.使受压部位悬空
E.安全防护，防止坠床
- 20.某一恢复期的患者能独立使用拐杖行走，其活动能力为
A.0度
B.1度
C.2度
D.3度
E.4度
- 21.王先生在测口腔温度时，不慎咬破体温计，护士首先应采取的措施是
A.了解咬破体温计的原因
B.检查体温计破损程度
C.清除口腔内玻璃碎屑
D.让患者喝 500ml 牛奶
E.给予电动吸引洗胃
- 22.关于脉搏，叙述错误的是
A.幼儿比成人快
B.同龄男性比女性快
C.老年人比较慢

- D.情绪激动时增快 E.休息睡眠时减慢
- 23.胸腹部禁用冷疗是为了防止
- A.体温骤降 B.心率过速 C.呼吸节律异常
D.反射性心率减慢及腹泻 E.微循环障碍
- 24.患者，女，36岁，车祸导致腹部闭合性损伤，疼痛剧烈。明确诊断后，护士遵医嘱给予镇痛剂，其目的是
- A.便于手术 B.减轻伤痛和刺激并防止神经源性休克 C.预防和控制感染
D.便于观察病情 E.有利于与患者的沟通
- 25.在鼻饲插管过程中，如果发现患者呛咳、呼吸困难等情况，此时应采取的措施是
- A.嘱患者深呼吸 B.托起患者头部再插 C.停止操作，取消鼻饲
D.嘱患者作吞咽动作 E.拔出管子，休息片刻后再重新插管
- 26.尿失禁患者的护理，错误的是
- A.用接尿器接尿 B.保持皮肤清洁干燥，预防褥疮 C.必要时留置导尿管
D.控制患者饮水，减少尿量 E.理解、安慰、鼓励患者
- 27.患者上消化道出血时粪便的颜色是
- A.鲜红色 B.陶土色 C.果酱样便
D.柏油样便 E.暗红色
- 28.多尿是指24h排尿量多于
- A.2500ml B.2000ml C.1800ml
D.1600ml E.1400ml
- 29.青霉素过敏性休克抢救时，首选药物是
- A.盐酸肾上腺素 B.盐酸异丙嗪 C.去甲肾上腺素
D.异丙肾上腺素 E.盐酸麻黄素
- 30.服用下列哪种药物需要监测心率
- A.磺胺类 B.青霉素 C.酸剂类
D.强心苷类 E.铁剂
- 31.输液过程中，患者突然出现呼吸困难、气促、咳血性泡沫痰的原因是
- A.输入致热物质 B.输液速度过快 C.输入药液浓度过高
D.输入空气栓子 E.输入变质液体
- 32.双侧瞳孔扩大见于
- A.脑疝早期 B.有机磷中毒 C.吗啡中毒
D.虹膜炎 E.颅内高压
- 33.对于服毒患者，最佳的洗胃时间是
- A.6h内 B.7h内 C.8h内
D.9h内 E.10h内
- 34.患者意识突然丧失伴下列哪种情况可作为心搏骤停的诊断标准

- A.面色苍白 B.瞳孔散大 C.皮肤紫绀
D.大动脉搏动消失 E.伤口停止出血
- 35.患者，男，69岁，肝癌晚期，入院时昏迷，呼之不应，心率40次/分，血压40/20mmHg，呼吸微弱，此期属于
- A.深昏迷期 B.濒死期 C.临床死亡期
D.生物学死亡期 E.脑死亡期
- 36.留取尿液标本时，为了防止其中的激素被氧化，应在标本中加入防腐剂
- A.甲醛 B.甲苯 C.浓盐酸
D.70%酒精 E.福尔马林
- 37.慢性支气管炎急性发作时最重要的治疗是
- A.控制感染 B.祛痰 C.镇咳
D.解痉 E.平喘
- 38.阻塞性肺气肿最主要的病因是
- A.过敏因素 B.环境因素 C.气候因素
D.长期吸烟 E.真菌感染
- 39.诊断早期肺心病的主要依据是
- A.慢性肺部疾病史 B.肺气肿体征 C.肺动脉充盈
D.肺动脉高压征 E.右心功能不全体征
- 40.哮喘发生的本质是
- A.变态反应 B.气道慢性炎症 C.气道高反应性
D.神经机制 E.遗传效应
- 41.支气管哮喘的主要临床表现是
- A.反复发作带哮鸣音的吸气性呼吸困难 B.反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
C.反复发作带哮鸣音的混合性呼吸困难 D.突然发作的持续性呼吸困难
E.逐渐加重的咳嗽、咳痰与呼吸困难
- 42.控制哮喘急性发作的首选药物为
- A.糖皮质激素 B.茶碱类药物 C.β₂受体激动剂
D.抗胆碱药 E.色苷酸钠
- 43.Ⅱ型呼吸衰竭是指
- A.PaO₂, <50mmHg, PaCO₂, >60mmHg B.PaO₂, >60mmHg, PaCO₂, <50mmHg
C.PaO₂, <60mmHg, PaCO₂, >50mmHg D.PaO₂, <80mmHg, PaCO₂, >50mmHg
E.PaO₂, <60mmHg, PaCO₂, <50mmHg
- 44.对呼吸衰竭患者采用持续低流量、低浓度吸氧的目的是为了
- A.保持缺氧对呼吸中枢的刺激作用
B.保持缺氧对颈动脉窦、主动脉体化学感受器的刺激作用
C.保持CO₂对呼吸中枢的刺激作用
D.保持CO₂对颈动脉窦、主动脉体化学感受器的刺激作用
E.保持缺氧及CO₂对呼吸中枢的刺激作用

- 45.心源性呼吸困难的特点是
- A.活动时加重，坐位时减轻
B.平卧时加重，咳嗽后减轻
C.休息时减轻，坐位时加重
D.平卧时减轻，活动后加重
E.平卧时减轻，活动后减轻
- 46.心源性水肿常首先出现在
- A.面部
B.双手
C.双足
D.腹部
E.胸部
- 47.急性肺水肿时，吸入的氧气通过 20%~30%的酒精湿化，其目的是
- A.降低肺泡表面张力
B.扩张肺泡壁血管
C.降低肺内泡沫表面张力
D.刺激咳嗽，利于痰液排出
E.使患者感觉舒适
- 48.下列哪项属于冠心病的次要危险因素
- A.血脂异常
B.高血压
C.糖尿病
D.吸烟
E.肥胖
- 49.心绞痛发作的典型部位是
- A.心尖部
B.剑突下
C.胸骨后
D.肩背部
E.咽喉部
- 50.多数急性心肌梗死患者，最早出现的突出症状是
- A.胸骨后疼痛
B.胃肠道反应
C.心源性休克
D.心力衰竭
E.发热
- 51.急性心肌梗死发生休克的主要机制是
- A.剧烈疼痛
B.坏死心肌吸收过敏
C.心律失常
D.心排出量急剧下降
E.反射性周围小动脉收缩
- 52.血管紧张素转换酶抑制剂的作用是
- A.减少肾素生成
B.减少血管紧张素原的生成
C.减少血管紧张素 I 的生成
D.减少血管紧张素 II 的生成
E.减少缓激肽的生成
- 53.下列哪项不是高血压心脏病的表现
- A.心脏向左扩大
B.主动脉瓣第二心音亢进
C.心电图示左室肥厚伴劳损
D.心尖部第四心音
E.二尖瓣开放拍击音
- 54.高血压患者钠盐摄入一般以每天多少食盐为宜
- A.12g
B.10g
C.8g
D.6g
E.4g
- 55.WHO 对糖尿病“空腹血糖”的定义标准中，“空腹”的含义是至少多少小时没有热量摄入
- A.6h
B.8h
C.10h
D.12h
E.24h
- 56.下列哪种情况可以确诊糖尿病

- A.连续两天静脉空腹血糖 $\geq 6.1\text{mmol/L}$
 B.连续两天 OGTT 餐后两小时血糖 $\geq 7\text{mmol/L}$
 C.连续两天静脉血浆空腹血糖 $\geq 7\text{mmol/L}$
 D.糖尿病症状+静脉血浆空腹血糖 $\geq 6.1\text{mmol/L}$
 E.糖尿病症状+随机血浆血糖 $\geq 7\text{mmol/L}$
- 57.病情未控制且肥胖的 2 型糖尿病患者，下列哪项最可能降低
 A.胆固醇 B.血压 C.甘油三酯
 D.体重指数 E.高密度脂蛋白
- 58.肥胖或超重的 2 型糖尿病患者第一线药物是
 A.罗格列酮 B.格列苯脲（优降糖） C.瑞格列奈（诺和龙）
 D.二甲双胍（甲福明） E.阿卡波糖（拜糖平）
- 59.糖尿病患者的饮食中，碳水化合物应占总热量的比例为
 A.20%~30% B.30%~40% C.40%~50%
 D.50%~60% E.60%~70%
- 60.患者，男，58 岁，无“三多一少”症状，空腹血糖为 6.5mmol/L ，有糖尿病家族史，疑糖尿病就诊，下列哪项检查对其最有诊断意义
 A.空腹血糖 B.餐后血糖 C.24h 尿糖定量
 D.葡萄糖耐量+胰岛素释放试验 E.糖化血红蛋白
- 61.关于 1 型糖尿病，下列哪种治疗方案最佳
 A.饮食管理 B.饮食管理+体力活动
 C.饮食管理+双胍类口服药 D.饮食管理+磺脲类口服药
 E.饮食管理+胰岛素应用
- 62.治疗糖尿病酮症酸中毒昏迷时，应以下列哪项为主
 A.补充液体和电解质，积极纠正酸中毒 B.小剂量胰岛素治疗，积极纠正酸中毒
 C.补充液体和平衡电解质，小剂量胰岛素治疗 D.小剂量胰岛素治疗，中枢兴奋剂
 E.积极纠正酸中毒，中枢兴奋剂
- 63.糖尿病患者最适宜的运动强度为活动后心率达到个体最大耗氧量的
 A.20% B.30% C.40%
 D.50% E.60%
- 64.关于 Graves 病并发浸润性突眼的描述，正确的是
 A.有甲亢一定同时有浸润性突眼 B.有浸润性突眼时，肯定已有甲亢
 C.甲亢严重程度与突眼程度平行 D.突眼程度一般与甲亢严重程度无关
 E.女性更易发生浸润性突眼
- 65.抗甲状腺药物的副作用中最常见的是
 A.药疹 B.肝功能损害 C.粒细胞减少
 D.药物热 E.肾功能损害
- 66.复方碘溶液治疗甲状腺危象的主要作用机制是
 A.抑制交感神经兴奋性 B.拮抗 β_2 受体 C.抑制脑垂体分泌 TSH

- D.减少甲状腺血流量 E.抑制甲状腺激素的合成，释放
- 67.急性肾小球肾炎的患者在急性期
- A.应绝对卧床休息 B.可适当下床活动 C.可从事轻体力活动
D.可从事正常体力活动 E.可参加体育锻炼
- 68.肾病综合征患者的治疗要点不包括
- A.注意休息 B.对症处理 C.及早使用激素治疗
D.急性肾衰患者应予短期透析 E.积极预防并发症
- 69.慢性肾小球肾炎的临床特点为
- A.浮肿、血尿，高血压
B.浮肿、蛋白尿、血尿、高血压、低蛋白血症
C.发作性肉眼血尿、无浮肿，高血压
D.浮肿、蛋白尿，高脂血症、低白蛋白血症
E.蛋白尿、血尿、水肿、高血压、肾功能损害
- 70.各型慢性肾小球肾炎的肾功能损害均首先表现为
- A.血肌酐升高 B.血尿素氮升高 C.肾脏CT异常
D.酚红排泄率降低 E.内生肌酐清除率降低
- 71.某中年慢性肾小球肾炎患者，中度水肿，血压为160/95mmHg，尿蛋白(+++)，血尿素氮为5mmol/L，血肌酐50μmol/L，原则上应给予下列哪项饮食最适宜
- A.低盐高糖 B.低盐高蛋白 C.低盐适量蛋白
D.低盐低蛋白 E.低盐禁蛋白
- 72.肾病综合征“三高一低”特征不包括
- A.高度水肿 B.高脂血症 C.高血压
D.大量蛋白尿 E.低蛋白血症
- 73.肾病综合征预后最差的是
- A.微小病变 B.局灶性阶段性肾小球硬化 C.IgA肾病
D.IgG肾病 E.膜性肾病
- 74.肾功能正常的肾病综合征患者应进食
- A.适量优质蛋白低脂饮食 B.低优质蛋白低脂饮食
C.高优质蛋白低脂饮食 D.高优质蛋白高脂饮食
E.适量优质蛋白高脂饮食
- 75.产生肾病性水肿的主要机制为
- A.肾小球滤过率下降 B.肾小管吸收增加 C.继发性醛固酮增多
D.低蛋白血症 E.毛细血管通透性降低
- 76.贫血最常见和最早出现的症状是
- A.头晕、头痛 B.耳鸣、眼花 C.心悸、气促
D.疲乏、无力 E.食欲不振
- 77.正常人消化道内铁吸收效率最高的部位是
- A.胃 B.十二指肠及空肠上部 C.空肠

- D.回肠 E.回盲部
- 78.口服铁剂治疗缺铁性贫血的正规治疗应该是
- A.不间断地服用 6~8 周
 B.一直服用到血红蛋白达到正常水平
 C.到略低于正常血红蛋白值然后待其自然增长到正常水平
 D.服至血红蛋白高于正常水平，以免复发
 E.血红蛋白达正常后再继续服 3 个月
- 79.患者，男，28 岁，全身皮肤可见陈旧性瘀点瘀斑，牙龈可见渗血，浅表淋巴结未及，胸骨无压痛，高热，最高体温为 39°C，胸片提示肺部感染;血常规示：Hb60g/L，WBC $2 \times 10^9/L$ ，PLT $16 \times 10^9/L$ ，网织红细胞的百分数为 0.001。该患者最可能的诊断是
- A.再生障碍性贫血 B.缺铁性贫血 C.巨幼红细胞性贫血
 D.溶血性贫血 E.脾亢进
- 80.下列哪种凝血因子不属于蛋白质
- A.XII B.VI C.IV
 D.VIII E.IX
- 81.易发生 DIC（弥散性血管内凝血）的白血病是
- A.AML-M1 B.ALL-L2 C.AML-M5
 D.AML-M3 E.CML
- 82.CNSL（中枢神经系统白血病）多见于
- A.急粒 B.急单 C.慢粒
 D.慢淋 E.儿童急淋
- 83.白血病化疗期间口服别嘌呤醇的目的是
- A.抑制尿素的合成 B.加强化疗药的疗效 C.抑制尿酸的合成
 D.加强尿酸的排泄 E.加强尿素的排泄
- 84.急性白血病患者在化疗缓解期中出现中枢神经系统白血病的主要原因是
- A.免疫功能降低 B.大多数抗白血病药物不易通过血 - 脑脊液屏障
 C.对化疗药物产生耐药性D.疗程不够
 E.化疗药物剂量不足
- 85.急性白血病易发生感染，主要原因是
- A.白血病细胞增加 B.继发性营养不良 C.成熟粒细胞缺乏
 D.长期贫血导致机体抵抗力下降 E.骨髓造血功能衰竭
- 86.慢粒慢性期的患者，最突出的症状体征是
- A.低热 B.胸骨压痛 C.巨脾
 D.体重下降 E.关节疼痛
- 87.胃溃疡与十二指肠溃疡的主要鉴别依据是
- A.疼痛部位 B.疼痛规律性 C.有无反酸
 D.胃液分析 E.有无呕血黑便
- 88.胃溃疡节律性疼痛的特点是

- A.空腹痛 B.餐时痛 C.半夜痛
D.餐后 0.5~2h 痛 E.餐后 3~4h 痛
- 89.肝昏迷患者灌肠时禁用肥皂水是因为
A.肥皂水易引起腹胀 B.肥皂水易引起肠穿孔 C.可以减少氨的吸收和产生
D.可以防止发生水肿 E.可以发生酸中毒
- 90.我国肝硬化最常见的诱因是
A.病毒性肝炎 B.营养不良 C.酒精中毒
D.循环障碍 E.遗传因素
- 91.对一个术后禁食的成年患者（无其他体液失衡），每日静脉输液总量至少为
A.1500ml B.2500ml C.3500ml
D.4000ml E.4500ml
- 92.体液中维持酸碱代谢平衡最主要的缓冲对是
A. $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ B. $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ C.磷酸盐/磷酸
D.血红蛋白/氧合血红蛋白 E.Pr/HPr
- 93.下列哪项为高渗性缺水的最早临床表现
A.皮肤弹性降低 B.乏力 C.口渴
D.烦躁 E.口腔黏膜干燥
- 94.麻醉前用药的目的不包括
A.提高痛阈以减少麻醉药用量 B.使患者情绪稳定、利于合作
C.减少不良神经反射 D.减少口腔和呼吸道分泌物
E.防止术中支气管痉挛
- 95.腰麻后头痛的主要原因是
A.脑脊液外漏致颅内压降低和颅内血管扩张
B.脑脊液外漏致颅内压降低和颅内血管收缩
C.脑脊液容量增加致颅内压增高和颅内血管扩张
D.脑脊液容量增加致颅内压增高和颅内血管收缩
E.脑膜受刺激致脑脊液分泌增加引起颅内压增高
- 96.患者，男，32岁，全麻后开始呼吸有鼾声，且呼吸急促，继之出现鼻翼扇动和“三凹征”，应首先考虑
A.呕吐物误吸 B.舌后坠 C.气管导管扭折
D.坠积性肺炎 E.低氧血症
- 97.穿无菌衣和戴无菌手套后，必须保持无菌的部位是
A.整个胸，腰、背部和双上肢 B.整个颈肩、胸，腹、背部
C.腰部以上的前胸、后背和双上肢 D.腰部以上的前胸和肩部
E.腰部以上的前胸、侧胸和双上肢
- 98.手术区皮肤的消毒范围，应包括切口周围
A.5cm B.10cm C.15cm
D.25cm E.30cm

99. 切开空腔脏器前，先用纱布垫保护周围组织的目的是
- A. 防止水分蒸发过多 B. 避免损伤空腔脏器 C. 防止或减少污染
D. 防止术后胃扩张 E. 防止术后腹胀
100. 手术室的室温一般应设在
- A. 15~19℃ B. 18~20℃ C. 20~24℃
D. 22~25℃ E. 26~28℃
101. 术后 3~6d 的发热，最常见的原因是
- A. 代谢异常 B. 低血压 C. 外科手术热
D. 输血反应 E. 感染
102. 以下防治术后肺不张的措施中，错误的是
- A. 术前锻炼深呼吸 B. 防制上呼吸道的急性感染 C. 及时用镇咳药
D. 防止手术后呕吐物吸入 E. 避免包扎过紧限制呼吸运动
103. 下列有关手术后患者不适的原因和处理中，叙述不正确的是
- A. 应有效解除术后疼痛 B. 顽固性呃逆时应使用镇静剂
C. 发热持续不退可能为并发症所致 D. 严重腹胀需及时处理
E. 术后尿潴留可引起泌尿系统感染
104. 下述关于肠内营养输注途径和方式的描述，正确的是
- A. 首选经管饲途径给予
B. 鼻胃管途径多用于需长期肠内营养支持者
C. 空肠造瘘途径适用于需短期肠内营养支持者
D. 对喂养管尖端位于胃内的患者可用分次输注方式
E. 胃肠功能和耐受性均较差的患者不适合连续输注
105. 下列适宜选用肠内营养支持的患者为
- A. 麻痹性肠梗阻 B. 食管静脉曲张出血期 C. 克罗恩病，腹泻多于 10 次/天
D. 大面积灼伤休克期 E. 短肠综合征术后稳定期
106. 二重感染是指
- A. 多种细菌引起的感染 B. 多种致病微生物引起的感染
C. 多种特殊厌氧菌引起的感染 D. 机体抵抗力下降一起反复的细菌感染
E. 抗生素应用过程中耐药菌株引起的感染
107. 患者，女，30 岁，下肢急性蜂窝组织炎伴全身感染症状，需要抽血做血培养和抗生素敏感试验，最佳采血时间为
- A. 寒战时 B. 高热时 C. 发热间歇期
D. 静脉滴注抗生素时 E. 抗生素使用后
108. 挤压综合征最主要的并发症是
- A. 呼吸困难 B. 休克 C. 心力衰竭
D. 肾衰竭 E. 昏迷
109. 重度烧伤后补液，晶、胶液体比例正确的是
- A. 一般为 1: 1 B. 一般为 1: 1.5 C. 一般为 2: 0.5

- D.一般为 1: 2 E.广泛深度烧伤为 0.5: 1
- 110.下列各种反应中, 经治疗可得到有效逆转的是
 A.超急性排斥反应 B.急性排斥反应 C.加速血管排斥反应
 D.慢性排斥反应 E.亚急性排斥反应
- 111.患者, 男, 43 岁, 肾移植术后第一天, 尿量为 500~800ml/h, 患者的补液量应为
 A.出量的 100% B.出量的 50% C.出量的 60%
 D.出量的 70% E.出量的 80%
- 112.下列措施不符合世界卫生组织提出癌症三阶梯止痛治疗方案原则的是
 A.口服为主 B.从小剂量开始 C.必须限制用药剂量
 D.不应对药物限制过严 E.非吗啡类药物效果不好时, 改用吗啡类药物
- 113.甲状腺次全切除术后, 甲状腺危象多发生在术后
 A.1~4h B.4~8h C.8~12h
 D.12~36h E.36~48h
- 114.患者, 女, 42 岁, 行单侧甲状腺大部分切除术, 术后 12h, 发现患者颈部肿大, 呼吸急促, 应立即
 A.吸氧 B.气管切开 C.拆除缝线, 清除血块
 D.蒸汽吸入 E.吸痰
- 115.乳癌患者乳房皮肤出现“橘皮样”改变是由于
 A.癌细胞堵塞皮下淋巴管 B.癌肿侵犯乳房 Cooper 韧带
 C.癌肿与胸肌粘连 D.癌肿与皮肤粘连
 E.癌肿侵犯乳管
- 116.乳癌常见而最早转移的淋巴结是
 A.同侧腋下淋巴结 B.锁骨下淋巴结 C.锁骨上淋巴结
 D.胸骨旁淋巴结 E.对侧腋下淋巴结
- 117.空肠瘘流出物的性状通常为
 A.蛋花样液体 B.糊状液体 C.胆汁样液体
 D.粪臭液体 E.绿黄色液体
- 118.一闭合性多根多处肋骨骨折的患者, 经包扎固定后仍咳嗽无力, 不能有效排痰, 并明显呼吸困难。则目前对其最佳的处理方案是
 A.鼓励患者尽早起床活动 B.气管内吸痰、气管切开或气管插管
 C.肋间神经阻滞或肋骨骨折处封闭 D.胸壁胶布固定
 E.给氧及祛痰药应用
- 119.多根多处肋骨骨折出现反常呼吸, 对其吸气相的叙述不正确的是
 A.软化胸壁内陷 B.纵膈摆向健侧 C.横膈上升
 D.患侧气道内的气体进入健侧肺脏 E.影响静脉血液回流
- 120.体外循环常和低温联合应用, 下列哪项不是其应用目的
 A.预防体温过高 B.降低机体代谢 C.减低转流量
 D.减少血液破坏 E.以利心肌保护

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1. 休克患者仰卧时抬高头，胸、下肢的目的是
A. 使静脉血回流增加 B. 减轻心肺的负荷 C. 有利于患者体位舒适
D. 减轻肺部瘀血 E. 有利于呼吸通畅
2. 下列无菌物品开启后，24h 内仍有效的是
A. 铺好的无菌盘 B. 正在进行静脉输液的输液器 C. 无菌容器
D. 打开的无菌包 E. 无菌溶液
3. 压疮易发生部位包括
A. 无血管神经走行处 B. 肌层较厚脂肪包裹处 C. 易受压部位
D. 骨骼突出处 E. 关节处
4. 高热降温，冰袋应放置在
A. 足部 B. 颈部、腋下 C. 胸前区、腹部
D. 前额、头顶 E. 腹股沟
5. 为膀胱高度膨胀患者导尿，第一次放尿超过 1000ml 时会出现
A. 虚脱 B. 血尿 C. 蛋白尿
D. 尿频尿痛 E. 反射性尿失禁
6. 影响人体平衡与稳定的因素有
A. 重量 B. 支撑面 C. 重心
D. 重力线 E. 压力
7. 床上擦浴的目的主要有
A. 促进血液循环 B. 防止过敏性皮炎 C. 增强皮肤排泄功能
D. 使患者舒适 E. 观察患者的一般情况
8. 隐血试验饮食在试验前 3d 应禁食
A. 豆制品、大白菜 B. 肝类，血类食物 C. 大量绿色蔬菜
D. 含铁的食物及药物 E. 马铃薯、豆制品
9. 肠胀气患者在饮食上应注意
A. 勿食用豆类食物 B. 选用清淡，易消化食物 C. 进食速度宜稍快
D. 少饮汽水 E. 多食高糖类食物
10. 下列属于肺气肿体征的是
A. 胸廓呈桶状 B. 呼吸活动度减弱 C. 触觉语颤增强
D. 叩诊呈浊音 E. 呼吸音减弱，吸气延长
11. 痰液黏稠不易咳出，可采取下列哪些护理措施
A. 多饮水 B. 雾化吸入 C. 按医嘱予祛痰药
D. 痰液较多者体位引流 E. 对痰多而无力咳出者助以翻身拍背或吸痰
12. 慢性肺源性心脏病患者氧疗期间的注意点有
A. 保持气道通畅 B. 监测氧流量，浓度 C. 监测呼吸和意识状态变化

- D.防火 E.监测动脉血气分析结果
- 13.慢性肺源性心脏病的并发症有
A.肺性脑病 B.感染 C.心率失常
D.消化道出血 E.电解质紊乱
- 14.与心血管系统疾病密切相关的不良生活方式有
A.高脂饮食 B.高钠饮食 C.吸烟
D.长期运动 E.少量多餐
- 15.左心功能不全的表现有
A.呼吸困难 B.咳嗽、咯痰 C.颈静脉怒张
D.肝脏肿大 E.肺部啰音
- 16.哪些情况容易发生洋地黄中毒
A.心动过速 B.严重缺氧 C.低血钾
D.心肌严重损失 E.肝、肾功能减退
- 17.下列哪些是急性心肌梗死溶栓成功的指征
A.体温升高 B.胸痛消失 C.ST段回降
D.出现再灌注心律失常 E.血清CK-MB酶峰值提前
- 18.长期血压增高可引起哪些靶器官损害
A.心脏 B.脑 C.脾脏
D.肾脏 E.血管
- 19.高血压的非药物治疗适用于
A. I级高血压 B. II级高血压 C. III级高血压
D.老年高血压 E.恶性高血压
- 20.糖尿病的微血管病变常累及
A.心肌组织 B.视网膜 C.肾
D.神经 E.脑
- 21.下列哪些药物是促胰岛素分泌剂
A.格列苯脲（优降糖） B.格华止 C.罗格列酮
D.瑞格列奈（诺和龙） E.阿卡波糖（拜糖平）
- 22.稳定骨折包括
A.横行骨折 B.嵌插骨折 C.螺旋形骨折
D.裂缝骨折 E.青枝骨折
- 23.下列哪些选项可导致骨折延迟愈合或不愈合
A.反复手法复位 B.固定不确切 C.清创时丢失骨片
D.没有达到解剖复位 E.合并感染
- 24.多根多处肋骨骨折导致低效性呼吸形态的原因是
A.反常呼吸运动 B.合并血气胸 C.纵膈移位
D.伤侧肺小支气管痉挛 E.呼吸道分泌物潴留
- 25.患者术后第1天，胸膜腔闭式引流瓶的长玻管水柱波动幅度增大，表明

- A. 两侧胸膜腔内压力不平衡
B. 呼吸道梗阻
C. 胸膜腔负压增大
D. 存在反常呼吸
E. 胸膜腔残腔过大
26. 关于肺癌的描述，正确的是
A. 中央型肺癌起源于主支气管、叶支气管
B. 下叶多于上叶
C. 小细胞肺癌预后最差
D. 鳞癌首先经淋巴转移
E. 腺癌多为中央型肺癌
27. 对于心脏瓣膜置换术后抗凝治疗，下列描述错误的是
A. 换生物瓣需抗凝 3~6 个月
B. 换机械瓣需抗凝 3~5 年
C. 要求患者的凝血酶原时间至对照值的 1.5~2 倍
D. 要求患者的凝血酶原时间至对照值的 2~3 倍
E. 有出血倾向应暂停药
28. 颅脑损伤昏迷患者早期气管切开目的是
A. 便于清除呼吸道分泌物
B. 解除呼吸道梗阻
C. 使颅内压下降
D. 便于气管内滴药或给氧
E. 使颅内压增加
29. 关于脑震荡的描述，以下哪些是正确的
A. 是常见、轻微的继发性脑伤
B. 有意识的短时丧失
C. 昏迷期间生命体征平稳
D. 克氏征阳性，巴氏征阴性
E. 伤后清醒常有逆行性遗忘
30. 颅底骨折，可造成损伤的颅神经有
A. 嗅神经
B. 视神经
C. 面神经
D. 听神经
E. 迷走神经