

历年真题试卷（九）

一、单项选择题（下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最合适的答案，写在答题纸上。共 90 题，每题 2 分，共 180 分）。

1.体位引流的禁忌是

- A.痰液黏稠 B.大咯血 C.频繁咳嗽
D.咳黄色脓痰 E.体弱

2.年老体弱、肺功能不全者慎用哪种镇咳药

- A.复方甘草片 B.喷托维林（咳必清） C.溴己新（必嗽平）
D.可待因 E.氯化铵

3.护理重症哮喘患者，下列哪项措施不正确

- A.按摩背部使患者感觉呼吸顺畅 B.病室维持一定湿度 C.持续低流量吸氧
D.限制液体摄入 E.禁忌使用吗啡

4.应用支气管扩张剂患者可出现

- A.低血压 B.心动过缓 C.心动过速
D.消化不良 E.眩晕

5.肺炎球菌肺炎最重要的体征是

- A.呼吸浅快、鼻翼扇动 B.口唇微发绀 C.唇周疱疹
D.肺部湿啰音 E.胸膜摩擦音

6.提示左心功能不全的体征是

- A.交替脉 B.下肢水肿 C.颈静脉怒张
D.肝肿大 E.腹水

7.血管扩张剂治疗心功能不全的主要作用机制是

- A.减慢心率 B.增加心肌收缩力 C.减轻心脏负荷
D.抑制心肌传导 E.减少心律失常发生

8.护士给患者应用地高辛前首先应评估

- A.1min 钟心率 B.24h 尿量 C.心电图
D.心功能 E.水肿程度

9.哪种心脏病在心衰改善后心脏杂音可增强

- A.心肌炎 B.风湿性心脏病 C.冠心病
D.肺源性心脏病 E.高血压性心脏病

10.随时有猝死危险的心律失常是

- A.室上性阵发性心动过速 B.室性阵发性心动过速
C.室性早搏落在前一心搏的 T 波上 D.多源性室性早搏
E.心房颤动

11.风湿性心脏病联合瓣膜病变较常见的是

- A.二尖瓣狭窄并主动脉瓣狭窄 B.二尖瓣关闭不全并二尖瓣狭窄

- C.主瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全
D.肺动脉瓣狭窄并肺动脉瓣关闭不全
E.二尖瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全
- 12.缓解心绞痛作用最快的药物是
A.硝酸异山梨醇酯
B.硝苯地平
C.硝酸甘油
D.冠心苏合丸
E.麝香保心丸
- 13.急进型高血压不包括下列哪种现象
A.舒张压 $\geq 16.9\text{kPa}$
B.多见于老年人
C.可死于肾衰竭
D.可导致心力衰竭
E.眼底出血
- 14.幽门梗阻所致的呕吐常发生在
A.进食后不久
B.进食后数小时
C.体位改变时
D.临睡前
E.活动后
- 15.肝细胞性黄疸患者伴随症状常有
A.恶心呕吐
B.发热、寒战
C.酱油色尿
D.白陶土样便
E.脂肪性腹泻
- 16.对早期肝癌诊断有价值的化验检查是
A.ALT
B.AST
C.AFP
D.AKP
E. γ -GT
- 17.急性肾盂肾炎患者的肾功能检查结果是
A.内生肌酐清除率减低
B.血尿素氮增高
C.酚红排泄率下降
D.尿比重低而固定
E.无异常发现
- 18.为酸化尿液宜服用
A.维生素 B₁
B.呋喃硫胺
C.维生素 C
D.氯化镁
E.碳酸钙
- 19.噻嗪类利尿剂最常见的不良反应是
A.低钾血症
B.低钠血症
C.高尿酸血症
D.高血糖症
E.高血氨症
- 20.缺铁性贫血患者受损害较常见的部位是
A.呼吸道
B.淋巴结
C.尿路
D.肠道
E.皮肤黏膜
- 21.特发性血小板减少性紫癜治疗首选
A.糖皮质激素
B.环磷酰胺
C.脾切除
D.血浆置换
E.大剂量免疫球蛋白
- 22.甲状腺功能亢进危象先兆的表现是
A.T₃、T₄升高
B.体温为 37.5℃
C.严重呕吐，腹泻
D.脉率为 110 次/min
E.烦躁或嗜睡
- 23.糖尿病饮食控制的主要作用是
A.刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素
B.减轻胰岛 β 细胞负担
C.增强胰岛素的皮下吸收
D.减少肠道葡萄糖的吸收

- E.减少肝糖原异生
- 24.皮质醇增多症的特征性表现是
 A.皮肤黏膜色素沉着 B.脊柱变形 C.多毛与痤疮
 D.向心性肥胖 E.皮肤紫纹
- 25.下列哪项表现一般不出现在系统性红斑狼疮患者
 A.发热 B.浅表淋巴结肿大 C.蝶形红斑
 D.关节畸形 E.蛋白尿、血尿
- 26.下列何种物质中毒后不会引起瞳孔缩小
 A.吗啡 B.有机磷农药 C.毒蕈
 D.巴比妥类 E.颠茄类
- 27.下列哪项中毒不能用 2%的苏打水洗胃
 A.曼陀罗类 B.毒蕈类 C.敌百虫
 D.敌敌畏 E.乐果
- 28.血沉无明显增快的疾病是
 A.贫血 B.脱水 C.恶性肿瘤
 D.急性心肌梗死 E.活动性结核病
- 29.冠心病猝死的最主要原因是
 A.严重心律失常 B.心脏破裂 C.肺梗死
 D.脑梗死 E.窒息
- 30.Crohn 病与肠结核的最重要区别在于
 A.有无发热、乏力，腹泻 B.OT 试验是否阳性 C.有无肠外结核
 D.肉芽肿有无干酪坏死 E.是否形成瘘管
- 31.关于体液含量描述正确的是
 A.体液含量与年龄、性别、胖瘦无关 B.年龄越小含水量相对越少
 C.通常成年男性含水量多于女性 D.与体内脂肪含量无关
 E.体液含量与年龄、性别无关
- 32.下列哪项不是高渗性脱水的原因
 A.长期禁食而补液不足 B.高热 C.上消化道梗阻
 D.大量出汗 E.剧烈吐泻
- 33.较早出现周围循环衰竭的体液失衡是
 A.高渗性脱水 B.等渗性脱水 C.低渗性脱水
 D.水中毒 E.低血钾症
- 34.下列水中毒的预防措施哪项是正确的
 A.尽量用清水洗胃 B.对肝肾功能正常的患者大量快速补液
 C.尽量用清水为巨结肠患者灌肠 D.洗胃最好用含钠的液体
 E.巨结肠患者禁止灌肠
- 35.维持呼吸性酸碱平衡的主要缓冲系统是
 A. $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ B.血浆蛋白 C.磷酸盐/磷酸

- D.膀胱挛缩 E.前列腺增生
- 59.骨牵引过度可引起
- A.肌肉萎缩 B.骨愈合障碍 C.肢体畸形
- D.剧烈疼痛 E.骨质脱钙
- 60.关于脊椎骨折，哪项描述有错误
- A.典型的体征是后突畸形 B.高位截瘫可能呼吸停止
- C.截瘫者常需 CT 或 MRI 检查 D.及时指导腹肌锻炼
- E.必须卧硬板床
- 61.关于颅内压增高的描述，下列哪项是错误的
- A.喷射性呕吐为最常见的表现 B.呕吐多与饮食无关
- C.出现视神经乳头水肿 D.护理上要防止肺部感染
- E.护理上要防止便秘
- 62.下列哪项不是现场救护的原则
- A.立即使患者脱离险区 B.救护过程中严格无菌操作 C.先救命后救伤
- D.争分夺秒 E.加强途中监护
- 63.我国于哪个年代成立了心脏监护病房
- A.20 世纪 50 年代 B.20 世纪 60 年代 C.20 世纪 70 年代
- D.20 世纪 80 年代 E.20 世纪 90 年代
- 64.下列关于热稀释漂浮导管的描述，哪项有错误
- A.管腔分 3 部分 B.第一腔通导管顶端 C.第二腔开口距管端 30cm
- D.第二腔开口于管侧 E.第三腔与导管近端处的小球囊相通
- 65.肾功能损害的早期表现
- A.夜尿>350ml，昼夜尿量比<6/1 B.夜尿>450ml，昼夜尿重比<4/1
- C.夜尿>550ml，昼夜尿重比<5/1 D.夜尿>650ml，昼夜尿量比<2/1
- E.夜尿>750ml.昼夜尿量比<3/1
- 66.在心搏骤停多长时间时心脏应激性最高
- A.30s 内 B.60s 内 C.90s 内
- D.120s 内 E.150s 内
- 67.关于脑复苏，下列哪项是错误的
- A.降温时间越早越好
- B.降温深度以 33~34℃为宜
- C.主要用物理降温的方法达到降温的目的和水平
- D.防治脑水肿是脑复苏的重要措施之一
- E.血压应维持在正常或稍高于正常水平
- 68.下列哪项不符合急性呼吸衰竭
- A.主要表现为缺氧 B.部分有二氧化碳潴留 C.根据动脉血气分为两型
- D.根据病理生理机制分为 2 种 E. I 型呼衰为低氧高碳酸血症
- 69.急性肝功能衰竭的“分离”现象，下列哪项描述是正确的

- A.白蛋白迅速下降而转氨酶明显升高
B.甲胎蛋白迅速下降而转氨酶明显升高
C.白蛋白迅速升高而转氨酶明显下降
D.转氨酶迅速下降而胆红素明显升高
E.甲胎蛋白迅速升高而胆红素明显下降
- 70.关于休克指数下列哪项描述是正确的
A.休克指数=脉率/舒张压
B.正常值为 1.0 左右
C.指数=0.5 时，提示血容量丧失 10%~20%
D.指数>0.5~0.8 时，提示血容量丧失 20%~30%
E.指数>1~2 时，提示血容量丧失 30%~50%
- 71.关于急性中毒的处理原则，下列哪项描述是正确的
A.一般服毒后 10h 内洗胃最有效
B.内服腐蚀性毒物应尽早彻底洗胃
C.有中枢神经系统抑制时用硫酸镁导泻
D.皮肤接触腐蚀性毒物者，冲洗 15~30min
E.利尿排毒，最好维持每小时尿量在 40~50ml
- 72.关于气管切开的适应证，下列哪项是错误的
A.咽喉部炎症
B.咽喉部肿瘤
C.咽喉部异物
D.下呼吸道炎症
E.严重出血性疾病
- 73.关于血液保存，下列哪项描述是正确的
A.国内 1U 血为 300ml
B.1U 血加 ACD 保存液 25ml
C.用 ACD 保存液有效保存期 28d
D.保存期主要指白细胞保存时间
E.血小板则 48h 就开始损失
- 74.有关缺氧对细胞代谢的影响，下列哪项描述是错误的
A.严重缺氧抑制细胞能量代谢的起始过程
B.细胞内的线粒体是生物氧化的中心部位
C.细胞内的线粒体是生成 ATP 的重要场所
D.葡萄糖在有氧条件下经过生物氧化分解为二氧化碳和水
E.机体严重缺氧，出现代谢性酸中毒
- 75.关于人工呼吸机的适应证，下列哪项是错误的
A.肺水肿
B.肺大泡
C.ARDS
D.肋骨骨折
E.低氧血症
- 76.使用人工呼吸机，吸入氧浓度不宜超过
A.40%
B.45%
C.50%
D.60%
E.70%
- 77.在常温下，肝对缺氧的耐受时间，下列哪项是正确的
A.3~5min 内
B.5~10min 内
C.10~15min 内
D.15~20min 内
E.20~25min 内
- 78.关于高压氧的适应证，下列哪项是错误的
A.一氧化碳中毒
B.破伤风
C.中耳炎

- A.入院 3d 出现支原体肺炎
B.输血 1 个月后出现的乙型病毒性肝炎
C.患者因尿频、尿急，尿痛入院，2 个月前曾做过扁桃体摘除术
D.新生儿败血症
E.出院 1 周后出现的流感
- 91.对急危重症患者心理活动的研究最适合采取下列哪种方式
A.调查研究
B.实验研究
C.心理测验
D.观察研究
E.个案研究
- 92.红、橙、黄色给人以温暖的感觉，这是感觉的
A.不敏感
B.适应现象
C.对比现象
D.联觉现象
E.选择现象
- 93.下列关于痛觉的说法，哪项不正确
A.痛觉的主观体验有显著的个体差异
B.痛觉与情绪的联系可以是正性的，也可以是负性的
C.痛觉不存在特定的适宜刺激
D.痛觉是一种复杂的感受
E.人们对痛觉的体验包括痛知觉和痛反应
- 94.远处的雷声实际响度未必高于近处的敲门声，但我们觉得雷声比敲门声响
A.体现出知觉的适应性
B.体现出知觉的选择性
C.体现出知觉的恒常性
D.体现出知觉的整体性
E.体现出知觉的理解性
- 95.下列哪项不属于人的认识过程
A.感觉
B.知觉
C.思维
D.记忆
E.情感
- 96."WAIS" 量表的主要目的是
A.评估人格
B.评估特殊能力
C.评估智力
D.评估心理健康
E.评估焦虑状态
- 97.系统脱敏法属于哪种治疗方法
A.森田疗法
B.精神分析
C.认知疗法
D.生物反馈疗法
E.行为疗法
- 98.下列哪种病不是心身疾病
A.原发性高血压
B.慢性支气管炎
C.心因性发热
D.偏头痛
E.糖尿病
- 99.患者对自己所患疾病出现心理反应过度，是下列哪种角色类型
A.患者角色强化
B.患者角色淡化
C.患者角色牵强
D.患者角色隐瞒
E.患者角色缺如
- 100.下列关于人格偏差的说法，哪项不正确
A.具有可控性
B.具有不可逆性
C.个体人格偏离常态的现象
D.属于人格异常
E.属于人格缺陷