



11. 桂枝汤、小建中汤、当归四逆汤中相同的药物是 ( )
- A. 桂枝、芍药、甘草、大枣  
B. 桂枝、芍药、甘草、生姜  
C. 桂枝、芍药、生姜、大枣  
D. 芍药、甘草、生姜、大枣  
E. 桂枝、甘草、生姜、大枣
12. 小建中汤中的君药是 ( )
- A. 桂枝  
B. 饴糖  
C. 芍药  
D. 桂枝与饴糖  
E. 饴糖与芍药
13. 治疗心肾阳虚寒厥证的代表方剂是 ( )
- A. 四逆汤  
B. 四逆散  
C. 真武汤  
D. 当归四逆汤  
E. 理中丸
14. 四逆汤主治证的病机是 ( )
- A. 心肾阳虚，阴寒内盛  
B. 脾肾阳虚，水湿内停  
C. 心肾阳虚，水湿内停  
D. 心阳不足，瘀血阻滞  
E. 肾阳不足，精亏血少
15. 患者四肢厥冷，恶寒蜷卧，神衰欲寐，面色苍白，腹痛下利，呕吐不渴，舌苔白滑，脉微细。治宜选用 ( )
- A. 四逆散  
B. 四逆汤  
C. 当归四逆汤  
D. 理中丸  
E. 真武汤
16. 药物组成中不含有干姜的方剂是 ( )
- A. 四逆汤  
B. 吴茱萸汤  
C. 理中丸  
D. 回阳救急汤  
E. 半夏泻心汤
17. 四逆汤与通脉四逆汤组成完全相同，其区别是 ( )
- A. 通脉四逆汤重用干姜  
B. 通脉四逆汤重用甘草  
C. 通脉四逆汤重用附子  
D. 通脉四逆汤重用干姜、甘草  
E. 通脉四逆汤重用干姜、附子
18. 当归四逆汤的功用是 ( )
- A. 温经散寒，养血通脉  
B. 活血化瘀，温经止痛  
C. 养血益气，温经化瘀  
D. 温经散寒，除湿止痛  
E. 化痰祛瘀，温经止痛
19. 当归四逆汤中通草的作用是 ( )
- A. 通经脉，畅血行  
B. 利水渗湿  
C. 活血利水  
D. 散寒通络  
E. 清热利水
20. 阳和汤的组成不包括下列哪味药物 ( )
- A. 麻黄  
B. 白芥子  
C. 桂枝  
D. 炮姜炭  
E. 生甘草
21. 阴疽见患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细。治疗宜选用 ( )

- A.仙方活命饮      B.普济消毒饮      C.阳和汤  
D.大黄牡丹汤      E.小金丹
- 22.阳和汤中可达皮里膜外，具有温化寒痰、通络散结作用的药物是（ ）  
A.麻黄              B.白芥子              C.肉桂  
D.炮姜炭              E.鹿角胶
- 23.下列何方的组成中不含有桂枝（ ）  
A.当归四逆汤      B.小建中汤              C.阳和汤  
D.肾气丸              E.温经汤
- 24.阳和汤的主治病证不包括（ ）  
A.贴骨疽              B.流注                  C.鹤膝风  
D.大头瘟              E.痰核

## 二、B1型题

- A.小建中汤              B.理中丸                  C.补中益气汤  
D.归脾汤                  E.吴茱萸汤
- 1.具有温中祛寒，补气健脾作用的方剂是（ ）  
2.具有补中益气，升阳举陷作用的方剂是（ ）  
A.助卫阳，通经络，解肌发表                  B.温通胸阳，通行血脉  
C.温中阳，祛寒邪                                  D.温阳化气行水  
E.温经散寒，温通血脉
- 3.桂枝在小建中汤中的作用是（ ）  
4.桂枝在当归四逆汤中的作用是（ ）  
A.温里散寒，发散水气                                  B.解肌发表，调和营卫  
C.温胃散寒，降逆止呕                                  D.发散风寒，和胃止呕  
E.解毒
- 5.生姜在吴茱萸汤中的作用是（ ）  
6.生姜在桂枝汤中的作用是（ ）  
A.温中与降逆并施，寓补益于温降之中                  B.温补并用，以温为主  
C.温阳与散寒并用，养血与通脉兼施                          D.温清消补并用，但以温经化瘀为主  
E.温补脾阳与攻下寒积并用
- 7.理中丸的配伍特点（ ）  
8.当归四逆汤的配伍特点（ ）  
A.四逆汤                  B.理中丸                          C.当归四逆汤  
D.四君子汤                  E.肾气丸
- 9.附子与干姜并用的方剂是（ ）  
10.人参与干姜并用的方剂是（ ）

## 三、X型题

- 1.理中丸主治（ ）

- A.脾胃虚寒证      B.中焦虚寒，肝脾失和证  
C.脾胃气虚证      D.脾虚夹湿证      E.脾阳虚失血证
- 2.理中丸的辨证要点有（ ）  
A.脘腹绵绵作痛      B.呕吐      C.口渴欲饮  
D.畏寒肢冷      E.大便溏泻
- 3.芍药、甘草同用的方剂是（ ）  
A.小建中汤      B.痛泻要方      C.桂枝汤  
D.芍药汤      E.四逆散
- 4.主治证候中可以见到手足厥冷的方剂是（ ）  
A.四逆汤      B.四逆散      C.乌梅丸  
D.当归四逆汤      E.大承气汤
- 5.组成中含有吴茱萸的方剂是（ ）  
A.左金丸      B.温经汤      C.四神丸  
D.吴茱萸汤      E.天台乌药散
- 6.当归四逆汤证的病机是（ ）  
A.营血虚弱      B.阴血亏虚      C.寒凝经脉  
D.血行不利      E.痰浊内阻
- 7.阳和汤主治证候中包括（ ）  
A.漫肿无头      B.皮色不变      C.酸热无痛  
D.口渴欲饮      E.舌淡苔白
- 8.组成中含有干姜的方剂是（ ）  
A.四逆汤      B.回阳救急汤      C.吴茱萸汤  
D.理中丸      E.半夏泻心汤
- 9.四逆汤配伍甘草的意义是（ ）  
A.益气补中      B.润肺止咳      C.缓解姜、附峻烈之性  
D.止咳化痰      E.调和药性，并使药力作用持久
- 10.小建中汤的主治证候包括（ ）  
A.腹中拘急疼痛，喜温喜按      B.心中悸动  
C.手足烦热      D.咽干口燥      E.脉细弦

## 参考答案

### 一、A1型题

- 1.B.吴茱萸汤具有温中补虚、降逆止呕作用，是治疗肝胃虚寒、浊阴上逆证的常用方。
- 2.B.吴茱萸汤由吴茱萸、生姜、人参、大枣组成。
- 3.B.吴茱萸汤由吴茱萸、生姜、人参、大枣组成。方中吴茱萸、生姜温中散寒，降逆止呕；人参、大枣补益中虚。其功用是温中补虚，降逆止呕。
- 4.D.吴茱萸汤与理中丸的相同药物是人参。
- 5.E.理中丸主治中焦脾胃虚寒证，其脉象多为沉细或沉迟无力，非弦数脉。

- 6.C.所述症状均是脾胃虚寒、运化升降失常的表现，故用理中丸治疗。
- 7.B.理中丸主治中焦虚寒证，干姜为方中君药。
- 8.B.理中丸由人参、干姜、白术、炙甘草组成；四君子汤由人参、茯苓、白术、炙甘草组成。两方均含有人参、白术、炙甘草。
- 9.B.小建中汤具有温中补虚，和里缓急的作用，同时又可以调和阴阳，柔肝理脾。
- 10.B.小建中汤中桂枝与芍药的用量比例是1：2.桂枝三两，芍药六两。
- 11.A.桂枝汤由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣组成；小建中汤由桂枝、芍药、饴糖、生姜、甘草、大枣组成；当归四逆汤由桂枝、芍药、甘草、大枣、当归、细辛、通草组成。三方中均含有桂枝、芍药、甘草、大枣。
- 12.B.饴糖具有温中补虚、缓急止痛作用，是小建中汤的君药。
- 13.A.四逆汤具有回阳救逆作用，是治疗心肾阳虚寒厥证的代表方剂。
- 14.A.四逆汤由附子、干姜、炙甘草组成，附子与干姜配伍有显著的回阳救逆作用。主治证的病机应为心肾阳虚，阴寒内盛。
- 15.B.所述症状均是心肾阳衰、阴寒内盛的表现，治疗急当回阳救逆，应选用四逆汤。
- 16.B.吴茱萸汤由吴茱萸、生姜、人参、大枣组成，不含有干姜。其他四方中均含有干姜。
- 17.E.通脉四逆汤与四逆汤均由附子、干姜炙甘草组成，只是通脉四逆汤加重了附子、干姜的用量。
- 18.A.当归四逆汤由桂枝、芍药、当归、通草、细辛、大枣、甘草组成。其中当归、芍药养血和血；桂枝、细辛温经散寒，温通血脉；通草通经络，畅血行；甘草、大枣补脾益气养血。诸药合用的功用是温经散寒，养血通脉。
- 19.A.当归四逆汤主治血虚寒凝经脉证，通草在方中的作用是通经脉，畅血行。
- 20.C.阳和汤中含有肉桂，但不含有桂枝。
- 21.C.阳和汤是治疗阴疽的常用方剂，阴疽治疗当首选阳和汤。
- 22.B.白芥子可达皮里膜外，在阳和汤中的作用是温化寒痰、通络散结。
- 23.C.阳和汤中使用的是肉桂，没有桂枝。其他四方均有桂枝。
- 24.D.大头瘟是风热疫毒所致，应以普济消毒饮治疗，非阳和汤的适应证。

## 二、B1型题

- 1.B.理中丸由干姜、人参、白术、炙甘草组成，具有温中祛寒、补气健脾作用。
- 2.C.补中益气汤由黄芪、人参、白术、炙甘草、当归、升麻、柴胡、陈皮组成，具有补中益气、升阳举陷作用。
- 3.C.小建中汤主治中焦虚寒，肝脾失和证。桂枝在方中的主要作用是温中阳，祛寒邪。
- 4.E.当归四逆汤主治血虚寒凝，经脉不利的手足厥寒证。桂枝在方中的主要作用是温经散寒，温通血脉。
- 5.C.吴茱萸汤主治肝胃虚寒，浊阴上逆证。生姜在方中主要起温胃散寒，降逆止呕作用。
- 6.D.桂枝汤主治外感风寒表虚证。生姜在方中主要起发散风寒，和胃止呕作用。
- 7.B.理中丸以干姜为君，温中散寒，配人参、白术、炙甘草补气健脾，具有温补并用、以温为主的配伍特点。
- 8.C.当归四逆汤以当归、芍药养血和血；配伍桂枝、细辛温经散寒，温通血脉；通草通经脉，

畅血行；大枣、炙甘草补脾养血益气。因此，该方具有温阳与散寒并用、养血与通脉兼施的配伍特点。

9.A.四逆汤由附子、干姜、炙甘草组成，方中附子与干姜并用。

10.B.理中丸由人参、干姜、白术、炙甘草组成，方中人参与干姜并用。

### 三、X型题

1.AE.理中丸具有温中祛寒，补气健脾作用。脾胃虚寒，运化升降失常；或脾气虚寒，不能统摄血液的失血病证，均可使用理中丸治疗。

2.ABDE.理中丸主治中焦脾胃虚寒证。其辨证要点应为脘腹绵绵作痛，呕吐，畏寒肢冷，大便溏泻等。

3.ACDE.小建中汤、桂枝汤、芍药汤、四逆散方中均含有芍药、甘草。痛泻要方由陈皮、白术、芍药、防风组成，不含有甘草。

4.ABCDE.首方剂的主治证候中均可以见到四肢逆冷。其中四逆汤因心肾阳虚，阴寒内盛，虚阳不能达于四末而四肢逆冷。四逆散因外邪传经入里，少阳枢机不利，阳气郁滞不达四末而手足逆冷。乌梅丸因剧烈腹痛，气机不利，阴阳之气不相顺接而手足逆冷。当归四逆汤因血虚寒凝经脉而手足逆冷。大承气汤因里热结实，阳气内郁，不达四末而手足逆冷。

5.ABCD.左金丸由吴茱萸、黄连组成；四神丸由补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子组成；吴茱萸汤由吴茱萸、生姜、人参、大枣组成；温经汤由吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬组成。以上四方均含有吴茱萸。

6.ACD.当归四逆汤由当归、桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣组成。具有温经散寒，养血通脉的作用。适应证的病机应为营血虚弱，寒凝经脉，血行不畅。

7.ABCE.阳和汤主治阴疽。其主要症状应为患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，舌淡苔白。

8.ABDE.四逆汤、回阳救急汤、理中丸、半夏泻心汤方中均使用干姜，只有吴茱萸汤中使用的是生姜。

9.ACE.四逆汤主治心肾阳气虚衰，阴寒内盛的危重病证。炙甘草在方中的作用是：①协助附子、干姜补益中气，以治虚寒之本；②缓解附子、干姜的峻烈之性；③调和药性，并使药力作用

持久。

10.ABCDE.小建中汤主治中焦虚寒，肝脾失和，阴阳气血化生不足的病证。故其症状表现为腹中拘急疼痛，喜温喜按，手足烦热，咽干口渴，心中悸动，脉弦细。