

历年真题试卷（十五）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1.现代医学模式是指

- A.生物医学模式
- B.生物、心理、社会医学模式
- C.生物、生理、社会医学模式
- D.生物、生理、心理医学模式
- E.生理、心理医学模式

2.作为护理程序结构框架的理论是

- A.信息论
- B.系统论
- C.奥瑞姆自护理论
- D.控制论
- E.人类基本需要层次论

3.2008 年 5 月 12 日起施行的我国第一部有关护理的卫生行政法规是

- A.《护士法》
- B.《护士条例》
- C.《护士管理条例》
- D.《中华人民共和国护理管理办法》
- E.《护士管理法》

4.患者，女，32 岁，因高热、呼吸困难 2d 入院，诊断为“肺炎”。护理体检：精神萎靡，体温为 39°C，呼吸困难，铁锈色痰。下列对该患者护理诊断的描述，正确的是

- A.肺炎球菌肺炎
- B.高热
- C.食欲下降与高热有关
- D.体温过高与致病菌引起的肺部感染有关
- E.支气管肺炎

5.早期诊断、及时治疗应属于纽曼健康系统模式的哪一级预防

- A.初级预防
- B.一级预防
- C.二级预防
- D.自我保护
- E.心理与生理防卫

6.用奥瑞姆自理模式护理患者时，护理系统的选择取决于

- A.医生医嘱
- B.患者自理能力
- C.病房护士编制
- D.患者的病情
- E.患者的自理需求

7.在护患关系建立初期，护患关系发展的主要任务是

- A.对患者收集资料
- B.确定患者的健康问题
- C.为患者制定护理计划
- D.与患者建立信任关系
- E.为患者解决健康问题

8.下列哪项不符合医院健康教育的原则

- A.要保证教育内容科学、准确、详实
- B.应在全面评估教育对象的基础上，制定具有针对性的健康教育计划
- C.要由浅入深、由简到繁，从具体到抽象，循序渐进地开展健康教育
- D.为了将健康教育计划落实，必要时可采取强制手段
- E.可以运用现代技术手段，如照片、影像等，生动地表现教学内容

9.以下哪项不属于个体发展性的自护需要

- A.怀孕期的自护需要
- B.儿童期的自护需要
- C.青春期的自护需要
- D.失去至亲时的调整
- E.生病时的诊疗需要

10.肿瘤患者常在刚得知自己被诊断为肿瘤时，第一反应是“那不是真的，定是搞错了”，他采用的心理防御机制是

- A.否认
- B.合理化
- C.转移
- D.投射
- E.认同

11. 护理诊断 PES 公式中的“S”代表
- A. 患者的健康问题 B. 症状或体征 C. 原因
D. 患者的现病史 E. 健康问题相关因素
12. 护士在实施护理操作前，因未清晰向患者解释而导致患者紧张的压力源属于
- A. 疾病严重程度 B. 住院环境陌生 C. 缺乏相关信息
D. 失去部分自由 E. 与家人分离
13. 病室的相对湿度为 70% 时，患者可出现
- A. 肌肉紧张 B. 咽干、口渴 C. 闷热、不适
D. 头晕、倦怠 E. 发热、多汗
14. 一人协助患者移向床头的操作中，下述哪项不妥
- A. 视病情放平靠背架 B. 取下枕头置床尾 C. 患者仰卧屈膝
D. 请患者双手握住床头栏杆，双脚蹬床面 E. 护士、患者协作配合，同时上移
15. 关于卧位及翻身的叙述正确的是
- A. 颅脑手术后，头部可卧于健侧或头高足低位 B. 胃肠胀气所致腹痛不宜采用俯卧位
C. 头低足高位是指抬高床尾 10~50cm D. 膝胸卧位适用于膀胱镜检查
E. 为患者翻身侧卧时，应使其下腿弯曲，上腿稍伸直
16. 使用燃烧法消毒灭菌时，不正确的操作是
- A. 锐利刀剪不能用燃烧法
B. 燃烧时需远离易燃易爆物品
C. 燃烧前容器应清洗干净
D. 中途可加入 95% 的乙醇提高灭菌效果
E. 应使容器内面全部被火焰烧到
17. 使用紫外线进行物品表面消毒，下列叙述正确的是
- A. 有效距离为 25~60cm，消毒时间为 20~30min
B. 有效距离不超过 2m，消毒时间为 30~60min
C. 消毒时间从灯亮后开始计时
D. 紫外线消毒的适宜温度为 18~20℃
E. 紫外线消毒的适宜湿度为 30%~40%
18. 下列哪项不符合隔离原则
- A. 隔离单位标记明显 B. 脚垫用消毒液浸泡 C. 门口设消毒盆、毛巾、手刷
D. 使用过的物品冲洗后立即消毒 E. 穿隔离衣后不得进入清洁区
19. 遇有真菌感染的患者，口腔护理应用的漱口液是
- A. 1%~4% 碳酸氢钠 B. 2%~3% 硼酸 C. 0.9% 氯化钠
D. 0.1% 醋酸 E. 1% 醋酸
20. 哪项不符合褥疮炎症浸润期的临床表现
- A. 受压表面呈紫红色 B. 皮下产生硬结 C. 局部可出现小水疱
D. 局部表皮松解剥脱 E. 浅层组织有脓液流出
21. 为昏迷患者做口腔护理时，以下操作正确的是
- A. 协助患者漱口 B. 由外向里擦净口腔及牙齿各面

- C.用开口器时，从门齿处放入
E.一般每日做 2~3 次口腔护理
- 22.急性肺水肿患者吸氧，湿化瓶内用 20%~30%乙醇，目的是
A.刺激呼吸中枢
B.吸收水分，减轻肺水肿
C.刺激血管收缩，减少渗出
D.消毒并湿润氧气
E.降低肺泡内泡沫表面张力
- 23.患者王某，男，肺炎患者，口温为 39.5℃，脉率为 120 次/min，面色潮红，皮肤灼热，伴有尿量减少，该患者目前处于
A.体温上升期
B.高热持续期
C.恢复期
D.退热期
E.恶化期
- 24.为患者测量血压时，由于血压计袖带缠得太紧，可使测得的
A.血压偏高
B.血压偏低
C.收缩压偏高，舒张压变化不大
D.收缩压和舒张压均可正确
E.舒张压偏高，收缩压变化不大
- 25.患者陈某，男，60 岁，因尿失禁给予双腔气囊导尿管留置导尿，下列操作中错误的是
A.插入导尿管，见尿后再插入 1~2cm
B.根据导尿管注明的气囊容量注入等量生理盐水
C.集尿袋不得超过膀胱高度并避免挤压
D.集尿袋每日定时更换
E.固定时注意膨胀的气囊不能卡在尿道内口
- 26.乙醇擦浴，禁擦的部位是
A.头部、四肢
B.腋窝，腹股沟
C.前胸、腹部
D.两侧肾区
E.手掌、脘窝
- 27.为患者鼻饲灌食后，应再注入少量温开水，其目的是
A.使患者温暖、舒适
B.便于测量、记录准确
C.防止患者呕吐
D.避免鼻饲液存积在管腔中变质
E.防止液体反流
- 28.患者因消化道疾病需做隐血试验，试验前 3d 内可进食
A.动物血
B.豆制品
C.绿色蔬菜
D.肉类
E.动物内脏
- 29.阿米巴痢疾患者进行保留灌肠常采用
A.左侧卧位
B.右侧卧位
C.头高脚低位
D.头低脚高位
E.仰卧位
- 30.长期留置导尿后，尿液出现浑浊、沉淀或结晶时应
A.观察尿量并记录
B.多饮水并进行膀胱冲洗
C.经常更换卧位
D.经常清洗尿道口
E.膀胱内滴药
- 31.青霉素引起过敏性休克的特异性抗体是
A.IgG
B.IgA
C.IgM
D.IgE
E.IgD
- 32.患者刘某，慢性呼吸道炎症，护士为其进行超声波雾化吸入，下列操作错误的为
A.连接雾化器各部，水槽内加入 50℃ 的蒸馏水

- B.操作轻稳，以免损坏电晶片及透声膜
 C.药液稀释至 30~50ml
 D.每次治疗时间为 15~20min
 E.治疗毕消毒雾化罐，螺纹管，口含嘴等
- 33.长期连续输液的患者，需多长时间更换输液器
 A.48h B.24h C.12h
 D.36h E.16h
- 34.溶血反应第二阶段的典型症状是
 A.头胀，四肢麻木 B.腰背部剧痛，血压下降
 C.黄疸，血红蛋白尿 D.少尿或无尿
 E.寒战发热
- 35.患者李某，与家人争吵后口服大量巴比妥钠，急送入院，立即给予洗胃，洗胃灌洗液宜用
 A.4%碳酸氢钠 B.0.9%氯化钠 C.0.1%硫酸铜
 D.温开水、硫酸镁 E.1: 15000 高锰酸钾
- 36.实施口头医嘱时做法不妥的是
 A.一般情况下不执行 B.抢救患者时可执行 C.执行后需补写医嘱
 D.手术中可执行 E.护士听清后立即执行
- 37.甲状腺功能亢进危象先兆的表现是
 A.T₃、T₄升高 B.体温为 37.5℃ C.呕吐、腹泻
 D.脉率为 110 次/分 E.焦虑、烦躁
- 38.患者，男，64 岁。测血压：153/105mmHg 该患者的血压分级是
 A.正常血压 B.正常高值 C.1 级高血压
 D.2 级高血压 E.3 级高血压
- 39.对行纤维支气管镜检查的患者，术前半小时应皮下注射
 A.麻黄碱 B.利多卡因 C.'肾上腺素
 D.阿托品 E.异丙肾上腺素
- 40.患者，女，48 岁。多饮、多尿伴体重下降 3 个月就诊。身高为 158Cm，体重为 51kg，尿糖（++++），尿酮（一），空腹血糖为 19.5mmol/L，HbA_{1c} 为 9.5%。应选择下列哪项治疗方案
 A.纯饮食控制 B.饮食控制加双胍类药物
 C.饮食控制加胰岛素治疗 D.饮食控制加 α-糖苷酶抑制剂
 E.脲类降糖药加胰岛素治疗
- 41.缺铁性贫血补充铁剂的首选方法是
 A.口服给药 B.静脉给药 C.肌肉注射
 D.皮下注射 E.皮内注射
- 42.评估急性胰腺炎患者的病情，哪项最能说明预后不佳
 A.体温为 39℃ B.黄疸 C.合并代谢性中毒
 D.全腹压痛、腹肌紧张 E.手足抽搐
- 43.需绝对禁食的情况是
 A.十二指肠溃疡合并黑便 B.肝性脑病前驱期

- C.胃溃疡大便隐血试验持续阳性
D.消化性溃疡合并幽门梗阻
E.急性水肿型胰腺炎
- 44.肝硬化并发上消化道出血的处理中不正确的措施是
A.绝对静卧,可给予适量地西洋
B.缓慢静脉注射垂体后叶素
C.肥皂水清洁灌肠
D.应用双气囊三腔管压迫止血
E.应用胃黏膜保护剂
- 45.患者,女,35岁,昨日因头痛、发热、鼻塞、流涕,服用感冒药物,今晨突然呕吐咖啡样液体及黑便,总量约为500ml,来急诊。体检:血压为90/60mmHg,脉搏为100次/min,肝脾无肿大。应首选下列哪项检查
A.血常规
B.肝功能检查
C.大便隐血检查
D.B超检查
E.急诊胃镜检查
- 46.下列腹水检查结果哪项对诊断结核性腹膜炎有重要意义
A.腹水比重为1.016
B.腹水葡萄糖<3.4mmol/L
C.腹水腺苷脱氨酶活性增高
D.腹水蛋白含量为30g/L
E.腹水<7.35
- 47.患者,女,20岁,因腹泻、血便、高热和全腹触痛伴反跳痛入院。结肠镜检查证实直肠黏膜弥漫性充血、质脆,易出血,伴有小的出血性溃疡。腹部平片显示横结肠段扩张。目前首先应作的处理是
A.紧急外科手术
B.等待粪便培养的结果
C.口服5-ASA
D.静脉滴注糖皮质激素
E.在24h内做肠系膜动脉造影
- 48.患者,女,28岁。诉心慌不适来诊,医嘱行心电图检查。护士在给该患者做心电图检查时单极胸导联V1电极应放在
A.胸骨右缘第四肋间
B.胸骨左缘第四肋间
C.左腋前线第四肋间
D.左腋中线第五肋间
E.左锁骨中线与第五肋间相交点
- 49.患者,男,46岁,诊断酒精性肝硬化18年,近2年频繁出现神志恍惚、定向障碍甚至昏迷。患者服用乳果糖调整大便pH多少为宜
A.2~3
B.3~4
C.4~5
D.5~6
E.6~7
- 50.护士帮助支气管扩张患者进行体位引流时,不正确的护理措施是
A.引流前向患者讲解配合方法
B.根据病变部位选择合适的体位
C.引流宜在饭后进行
D.每次引流的时间15~20min
E.若患者合并严重心血管疾病,则不宜采用头低位进行体位引流
- 51.风湿性疾病多系统损害中发生率最高的是
A.心脏
B.关节
C.脑血管
D.肺和胸膜
E.皮肤
- 52.对于乙脑患者,护士应配合医生进行抢救的是针对下列哪组症状
A.高热、头痛、呼吸衰竭
B.高热、恶心、呼吸衰竭
C.高热、嗜睡、呼吸衰竭
D.高热、惊厥、呼吸衰竭
E.以上都是
- 53.艾滋病毒主要侵犯下列哪种免疫细胞而引起免疫功能缺陷
A.抑制性T淋巴细胞
B.辅助性T淋巴细胞
C.单核细胞

D.巨嗜细胞 E.B 淋巴细胞

54.患者，男，55岁，患急性淋巴细胞白血病。医嘱静脉推注长春新碱。护理措施错误的是

- A.静注时边抽回血边注药
- B.外周静脉应选择粗直的
- C.首选中心静脉
- D.推注药物前，先用生理盐水冲管，确定针头在静脉内方能注入
- E.输注时若发现外渗，立即拔针

55.某尿毒症患者，每天晨间出现恶心呕吐，对症护理措施为

- A.睡前勿进食.勿进水
- B.睡前吃少量点心
- C.睡前饮水 1~2 次
- D.夜间饮水 1~2 次
- E.起床前先服止呕剂

56.夜尿增多为

- A.夜间尿量持续超过 750ml/d
- B.夜间尿量持续超过 650ml/d
- C.夜间尿量持续超过 550ml/d
- D.夜间尿量持续超过 450ml/d
- E.表现夜尿次数增多

57.慢性肾衰竭后期的患者，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

- A.少尿，高血钾
- B.重度贫血
- C.乏力.食欲减退
- D.血结合钙降低
- E.呼吸有尿臭味

58.患者，男，65岁。3年前被诊断为“肺心病”，近日因感冒后呼吸困难加重入院。护士对该患者所采取的氧疗方式正确的是

- A.间歇高流量给氧
- B.间歇低流量给氧
- C.持续高流量给氧
- D.持续低流量给氧
- E.高压给氧

59.观察心律失常时，最危险的情况是

- A.频发室性期前收缩
- B. II、III度房室传导阻滞
- C.心房颤动
- D.阵发性室上性心动过速
- E.多源性期前收缩

60.慢性呼吸衰竭诱发急性呼吸困难的重要因素为

- A.精神紧张
- B.过度劳累
- C.呼吸道感染
- D.长期吸烟
- E.体质虚弱

61.心绞痛发作的首要护理措施是

- A.立即描记心电图
- B.观察疼痛性质
- C.给予吸氧
- D.让患者安静坐下或半卧
- E.建立静脉通路

62.原发性高血压最常见的死亡原因是

- A.尿毒症
- B.心律失常
- C.心力衰竭
- D.高血压危象
- E.脑血管意外

63.洋地黄中毒所致完全性房室传导阻滞，禁用

- A.麻黄素
- B.糖皮质激素
- C.氯化钾
- D.异丙基肾上腺素
- E.普鲁苯辛

64.患者，女，47岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄6年余，近日上呼吸道感染后出现心力衰竭表现，乏力.稍事活动就心慌、憋气，伴有食欲不振，肝区胀痛，双下肢轻度水肿，双肺底湿啰音，心率为128次/min，护士应如何指导患者休息

- A.活动不受限制 B.从事轻体力活动 C.增加睡眠时间,可起床做轻微活动
D.卧床休息,限制活动量 E.严格卧床休息,采取半卧位
- 65.患者,男,28岁,自觉突然心慌、胸闷,听诊心率为160次/min,心律齐,心音均等,血压正常。若心电图出现完全不规则的大波浪状曲线,且QRS波与T波消失。你考虑下列哪项处理不妥
- A.准备抢救用品 B.可于心内注射利多卡因
C.可施行同步电除颤复律 D.立即做胸外按压和口对口人工呼吸
E.立即通知医生进行抢救
- 66.某胃溃疡患者,近月来腹痛节律性消失,消瘦,大便隐血试验持续阳性,应考虑为
- A.溃疡活动 B.幽门梗阻 C.慢性穿孔
D.溃疡癌变 E.上消化道出血
- 67.病毒性心肌炎护理重点在于
- A.加强锻炼,增强机体抵抗力 B.接种流感疫苗,预防感冒
C.充分休息,保证丰富的营养 D.绝对卧床3个月,低盐饮食
E.小量应用糖皮质激素,并注意不良反应
- 68.患者,女,20岁。四肢关节疼痛7个月,近2个月出现面颊部对称性红斑,反复发作口腔溃疡,诊断为“系统性红斑狼疮”。以下护理措施不恰当的是
- A.避免辛辣等刺激性食物 B.坚持饭后漱口 C.少食多餐
D.优质低蛋白饮食 E.可以进食蘑菇、芹菜等食物
- 69.治疗肝性脑病时,减少肠道有毒物质生成和吸收的措施为
- A.禁食蛋白质 B.应用降氨药物 C.吸附性血液灌注
D.静脉输注氨基酸 E.纠正低钾和碱中毒
- 70.口服硫酸亚铁必有的副作用是
- A.黑便 B.便秘 C.腹泻
D.恶心 E.腹痛
- 71.患者,女,68岁。身体虚弱,中暑后入院治疗,以下何种措施对患者预后具有决定作用
- A.脱离高温环境 B.补充体液 C.快速降温
D.平卧 E.保持呼吸道通畅
- 72.胃镜检查术后护理措施不妥的是
- A.术后禁食1d,防止胃扩张 B.嘱患者不要用力咳嗽
C.术后可按摩腹部,减轻腹胀 D.不要吞咽唾液,以免呛咳
E.检查后数天内应密切观察患者有无并发症
- 73.关于瘫痪,下列哪种说法是错误的
- A.四肢瘫是指双侧上下肢均瘫 B.单瘫是指一个肢体瘫痪
C.交叉瘫是指一侧上肢和另一侧下肢瘫 D.截瘫是指双下肢瘫
E.偏瘫是指一侧面部与肢体瘫痪
- 74.下列哪项护理措施不可用于缺血性脑血管意外
- A.保持环境安静 B.避免不必要的搬动 C.头部置冰袋或冰帽
D.血压监护,避免降压过快 E.注意观察意识状态改变
- 75.特发性面神经麻痹在护理上应防止发生

- A.角膜溃疡 B.面肌萎缩 C.下颌窦感染
D.面肌痉挛 E.下颌关节脱位
- 76.重症肌无力患者出现呼吸困难紧急处理不正确的是
A.改善通气,纠正缺氧 B.保持呼吸道通畅 C.及时正确使用人工呼吸器
D.严密观察呼吸困难的程度 E.立即高流量、高浓度给氧
- 77.休克型肺炎最突出的表现是
A.血压降低 B.高热 C.意识障碍
D.少尿 E.四肢厥冷
- 78.确诊肺结核最有价值的检查项目是
A.结核菌素试验 B.痰找结核菌 C.胸部 X 线检查
D.CT 检查 E.血液细菌培养
- 79.某呼吸衰竭患者,应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中,出现恶心、呕吐,烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象应考虑
A.肺性脑病先兆 B.通气量不足 C.呼吸兴奋剂过量
D.呼吸性碱中毒 E.痰液阻塞
- 80.某咯血患者突然出现表情恐怖、张口瞪目、两手乱抓等窒息现象,首先应该
A.准备抢救用品 B.行人工呼吸 C.使用呼吸中枢兴奋剂
D.使用镇咳药 E.立即置患者头低脚高位
- 81.患者,男,60岁,慢性肺心病患者,心力衰竭治疗中,下列应慎重使用的措施是
A.控制感染 B.支气管解痉剂 C.血管扩张剂
D.强心利尿剂 E.糖皮质激素
- 82.以下哪种情况有助于鉴别心源性哮喘与支气管哮喘
A.哮鸣音与双肺底小水泡音 B.端坐呼吸
C.咯粉红色泡沫痰 D.心脏扩大
E.高血压
- 83.患者,男,59岁,咳嗽、咯痰20年,加重10d,昏睡1d,明显紫绀,呼吸为10次/min,表浅,双肺闻干湿啰音,心率为110次/min, BP120/80mmHg, 血气分析: PaO₂32mmHg, PaCO₂80mmHg, pH7.293, 最重要的抢救措施是
A.可拉明静脉点滴 B.多巴胺静脉点滴 C.5%碳酸氢钠静滴
D.呼吸机辅助呼吸 E.β₂受体兴奋剂喷雾吸入
- 84.患者,女,24岁,右侧胸腔大量积液,因呼吸困难不能平卧而行胸穿排液,操作中患者感头晕,心慌,面色苍白,冷汗,脉搏细数,血压降低,应立即采取的应急措施是
A.静滴多巴胺等血管活性药 B.快速输注低分子右旋糖酐
C.平卧、皮下注射肾上腺素 D.缓慢静注西地兰
E.吸氧并静注氨茶碱
- 85.低钾血症患者最早出现的临床表现是
A.肠麻痹 B.四肢无力 C.心动过缓
D.恶心呕吐 E.血压下降
- 86.以下可引起代谢性碱中毒的是
A.急性肾衰竭 B.幽门梗阻伴呕吐 C.急性腹膜炎

- D.长期禁食 E.休克
- 87.患者,女,因休克进行扩容疗法快速输液时,中心静脉压为 1.47kPa (15cmH₂O),血压为 10.7/8kPa (80/60mmHg)。应采取的措施是
- A.大量输液加快速度 B.控制速度,减慢输液 C.减慢输液加用强心剂
D.暂停输液 E.用升压药
- 88.最容易引起急性肾衰竭的外伤是
- A.冲击伤 B.切割伤 C.撕脱伤
D.严重挤压伤 E.烧伤
- 89.关于手术.创伤后糖代谢的叙述,下列正确的是
- A.胰岛素水平降低 B.糖的利用率增高 C.机体利用糖的能力降低
D.糖主要为心脏提供能量 E.以糖原合成为主
- 90.患者,男,32岁,因下肢骨折,在腰麻下行骨折切开复位内固定术,术后 8h 出现头痛,一般止痛药物不能缓解。其头痛的原因可能是
- A.脑脊液外漏 B.颅内压升高 C.脑血管痉挛
D.脑缺氧 E.血压升高
- 91.患者,女,预行盆腔手术,在硬膜外麻醉后出现低血压,意识丧失,循环呼吸停止,最可能的原因是
- A.麻醉剂过敏 B.局麻药毒性反应 C.全脊髓麻醉
D.硬膜外间隙出血 E.脑脊液流失过多
- 92.术后早期活动的优点,下列哪种说法不正确
- A.减少血栓性静脉炎的发生 B.减少切口感染
C.减少肺部并发症 D.防止腹胀、便秘
E.促进排尿功能的恢复
- 93.腹股沟疝修补术属于
- A.择期手术 B.限期手术 C.急症手术
D.诊断性手术 E.姑息性手术
- 94.手术剪刀的消毒方法是
- A.高压蒸汽灭菌 B.煮沸法 C.化学灭菌法
D.微波消毒灭菌 E.燃烧法消毒
- 95.患者,男,46岁,患腹股沟斜疝后行疝修补术。术后第 2d 体温升至 37.9°C, 2d 后恢复正常,其可能的原因是
- A.外科手术热 B.伤口感染 C.伤口裂开
D.肺部感染 E.肠道感染
- 96.患者,女,20岁,上唇疖,因用力挤压后出现眼部及其周围组织的进行性红肿,寒战、发热、头痛、呕吐。应考虑为
- A.脑脓肿 B.全身感染 C.急性蜂窝织炎
D.颅内感染 E.脓毒症
- 97.患儿,男,6岁,在玩耍时不慎被砸碎的玻璃划破手臂,伤口深、出血多,压迫止血后 6h 来医院就诊。体检发现一长约 2Cm 的伤口,边缘整齐,无明显污染。此时采取的处理方法是
- A.清创后一期缝合 B.清创后二期缝合 C.清创后不缝合

- D.伤口冷敷 E.控制感染，加强换药
- 98.患儿，男，3岁，两下肢（包括臀部）II度烫伤，其烧伤面积是
 A.30% B.37% C.41%
 D.43% E.46%
- 99.患者，女，35岁，在甲状腺次全切除术后4h，突然出现呼吸困难，颈部肿胀，口唇发绀。针对该患者采取的紧急处理措施是
 A.吸氧 B.立即剪开颈部缝线，去除血肿
 C.气管切开 D.注射呼吸兴奋剂 E.气管插管
- 100.患者，女，61岁，上腹部手术后第6天，出现顽固性呃逆，应警惕的是哪种并发症
 A.切口感染 B.肺不张 C.肠梗阻
 D.胃扩张 E.膈下感染
- 101.女性乳房自我检查的时间最好在
 A.月经来潮前1~3d B.月经来潮后3~5d C.月经期
 D.月经干净后2~3d E.月经干净后7~10d
- 102.破伤风最早发生强直性痉挛的肌群是
 A.面肌 B.咀嚼肌 C.颈项肌
 D.背腹肌 E.膈肌
- 103.患者，男，28岁，5d前被车撞伤左上腹，当时左上腹有胀痛伴局部压痛，入院后医生给予保守治疗。今晨患者突然晕倒，面色苍白，脉搏细速，体检无明显腹膜刺激征。该患者最可能的诊断是
 A.肝破裂 B.脾破裂 C.胆囊穿孔
 D.肾破裂 E.胃穿孔
- 104.外伤性急性硬膜外血肿，最典型的意识障碍是
 A.昏迷 - 清醒 - 昏迷 B.早期清醒 - 昏迷 C.持续昏迷加深
 D.昏迷 - 嗜睡 E.以上都不对
- 105.患者，男，68岁，右侧腹股沟区可复性肿块7年，肿块有时可进入阴囊。体检：有腹股沟区肿块，可还纳，外环口容二指，压迫内环后，肿块不再出现。鉴别其是腹股沟斜疝还是直疝，最有意义的鉴别点是
 A.发病年龄
 B.突出途径
 C.疝块形状
 D.疝内容物是否进入阴囊
 E.还纳疝内容物、压迫深环后疝内容物是否再突出
- 106.患者，男，35岁。因胸部手术放置胸腔闭式引流管，睡眠时翻身不慎将胸腔闭式引流管自胸壁伤口拉出。对其首要的护理措施是
 A.报告医师 B.送手术室处理 C.给患者吸氧
 D.用手指捏紧引流口周围皮肤 E.将脱落的引流管重新插入
- 107.胃肠减压的禁忌证是
 A.小肠破裂 B.食管静脉曲张 C.急性出血性坏死性胰腺炎
 D.肠梗阻 E.胃穿孔
- 108.细菌性肝脓肿致病菌最主要的侵入途径是

天任考研

- A.淋巴管 B.胆管 C.门静脉
D.肝动脉 E.腹腔邻近感染累及
- 109.患者，男，50岁，经常发生肾绞痛、血尿，疑为肾结石，需做静脉肾盂造影。造影前准备下列哪项不正确
A.常规肠道准备 B.当天禁食早餐 C.鼓励饮水
D.检查前排尽小便 E.需作碘过敏试验
- 110.患者因急性阑尾炎穿孔，腹膜炎，手术后第三天，体温升高达39°C，伴大便次数增多，里急后重，黏液便，伤口不痛，无咳嗽，考虑哪项可能性最大
A.切口感染 B.菌痢 C.肠炎
D.盆腔脓肿 E.肺炎，肺不张
- 111.胆管手术后，T管一般留置的时间是
A.3d B.7d C.14d
D.20d E.30d
- 112.肠梗阻非手术治疗期间，梗阻解除的标志是
A.胃肠减压后腹痛减轻 B.呕吐后腹胀减轻 C.轻度压痛无肌紧张
D.肛门排便排气 E.肠鸣音亢进转为消失
- 113.骨筋膜室综合征表现中哪项不对
A.局部剧烈疼痛 B.局部肿胀、严重压痛 C.指或趾活动受限、感觉麻木
D.局部及远端皮色苍白 E.早期远端动脉搏动消失
- 114.下肢静脉曲张的早期症状是
A.溃疡形成 B.破裂出血 C.静脉炎
D.静脉血栓 E.下肢沉重感
- 115.肠梗阻的四大症状是
A.恶心，腹痛、腹胀，肠鸣音亢进 B.腹痛、肠型、呕吐、排气排便停止
C.腹痛腹胀、呕吐、排气排便停止 D.腹痛、肠鸣音亢进、呕吐、发热
E.腹痛、腹胀、呕吐、发热
- 116.甲状腺癌患者如出现霍纳氏综合征，癌肿可能已经压迫
A.气管 B.颈交感神经节 C.喉返神经
D.喉上神经 E.食管
- 117.阑尾炎手术后第4d，患者诉说切口疼痛，以下措施正确的是
A.给予杜冷丁肌注 B.指导患者用手捂住切口
C.给予去痛片口服 D.检查有无切口感染
E.告知患者减少活动量
- 118.肺癌早期的症状是
A.刺激性干咳、痰中带血丝 B.大量咳血 C.胸闷、气短
D.胸痛 E.吞咽困难
- 119.患者，女，22岁，小腿行石膏绷带包扎后1h，出现脚趾剧痛，苍白发凉，足背动脉搏动减弱，应首先采取的措施是
A.注意保暖 B.抬高患肢 C.给予止痛药
D.做下肢被动活动 E.适当松解石膏绷带

120.胆管手术后 T 管引流患者护理，下列哪项不正确

- A.妥善固定 T 管
- B.观察 24h 胆汁引流量
- C.必要时可用无菌盐水冲洗导管
- D.置管 7d 可以拔管
- E.拔管前须试行夹管 1~2d

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.奥瑞姆的自护理论中，全补偿护理系统适用于

- A.昏迷患者
- B.活动完全受限者
- C.严重精神障碍患者
- D.婴儿
- E.术后麻醉未醒者

2.护理理念的基本要素有

- A.健康
- B.环境
- C.护理
- D.人
- E.关怀

3.建立良好的护患关系对护士的要求是

- A.保持健康的生活方式和情绪
- B.充实自己，提高沟通技巧
- C.真诚对待患者，适当表达移情
- D.尊重患者权利和人格
- E.最大限度调动患者积极性

4.奇脉常见于

- A.伤寒
- B.心包积液
- C.主动脉瓣狭窄
- D.甲状腺功能亢进
- E.缩窄性心包炎

5.需进行特殊口腔护理的患者有

- A.禁食患者
- B.高热患者
- C.危重患者
- D.鼻饲患者
- E.口腔疾患患者

6.预防免疫功能低下患者发生医院感染正确的是

- A.注射相关疫苗
- B.广谱抗生素肠道去污染
- C.治疗潜在性感染病灶
- D.保护性隔离
- E.保护皮肤黏膜的完整性

7.下列关于青霉素过敏试验的注意事项，正确的是

- A.初次用药，应用中更换批号，须做过敏试验
- B.有青霉素过敏史者，须做过敏试验
- C.皮试结果阳性者不可使用青霉素
- D.首次注射后须严密观察 30min，注意局部和全身反应
- E.皮试结果有怀疑，应在对侧前臂皮内注射生理盐水 0.1ml，以作对照

8.急救药品和各种抢救设备应做到“五定”，不包括

- A.定数量
- B.定专人管理
- C.定期使用
- D.定时检查记录
- E.定期消毒灭菌

9.记录患者每日排出量，包括

- A.尿量
- B.呕吐物量
- C.大便量
- D.创面渗液量
- E.咳痰量

10.关于糖尿病患者的饮食治疗，以下哪些是正确的

- A.糖应占总热量的 60%
- B.纤维摄入量最好每天 40g
- C.每天胆固醇摄入量要小于 300mg
- D.蛋白质中植物蛋白越多越好

- E.三餐分配一般为 1/5、2/5、2/5
- 11.引起肺血栓栓塞症的高危因素包括
 A.长时间不活动 B.下肢骨折 C.大手术后
 D.有静脉血栓栓塞史 E.肥胖
- 12.食管胃底静脉曲张破裂大出血患者，既往有冠心病史，以下处理哪项是正确的
 A.严密监测病情 B.积极补充血容量 C.静滴生长抑素
 D.静滴血管加压素 E.胃镜下止血
- 13.关于三腔双囊管的应用和护理措施，正确的是
 A.在每条管的末端做好标记 B.插管时应使用液体石蜡润滑气囊与管
 C.插管深度约为 65Cm D.先向食管囊充气
 E.嘱咐患者将口腔分泌物及时咽下
- 14.'肾病综合征患者蛋白尿的特点包括
 A.大量蛋白尿 B.多伴有血尿 C.非选择性蛋白尿
 D.蛋白尿出现较早 E.尿蛋白以清蛋白为主
- 15.以下哪些心电图表现符合心房颤动
 A.P 波消失 B.出现间隔均匀，形状相似的 F 波
 C.R-R 间隔绝对不等 D.QRS 波增宽、畸形
 E.房室呈 2: 1 或 3: 2 传导
- 16.感染性心内膜炎的诊断标准有
 A.两次血培养阳性，且病原菌完全一致 B.发热，体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 C.Janeway 损害 D.Osler 结节
 E.超声心电图发现赘生物
- 17.急性白血病发生贫血的原因是
 A.正常红细胞生成减少 B.吸收障碍 C.无效性红细胞生成
 D.溶血 E.出血
- 18.下列哪些属于脑干损伤的特点
 A.意识障碍 B.去皮质强直 C.交叉瘫痪
 D.定位体征 E.阵发性眩晕
- 19.应用抗癫痫药物应注意的是
 A.根据发作类型选药 B.通常选用联合用药 C.药物剂量个体化
 D.注意药物不良反应 E.症状消失后即停药
- 20.提示水封瓶闭式引流通畅的指标是
 A.长玻璃管的水柱升高 B.不断有气泡从长玻璃管中溢出
 C.玻璃管水柱随呼吸上下波动 D.患者咳嗽时有气泡溢出
 E.玻璃管水柱始终为静止状态
- 21.为一位急性肺栓塞的患者进行身体评估，可获得的体征有
 A.体温为 37.8°C B.心率为 124 次/分 C.发绀
 D.咯血 E.肺部闻及哮鸣音
- 22.下列关于低钾血症的描述正确的是

- A.肌无力 B.传导阻滞 C.心律异常
D.代谢性酸中毒 E.胃肠道蠕动减慢

23.关于大面积烧伤休克期输液，下列哪些是正确的

- A.胶体液和电解质液之比一般为 0.5: 1 B.维持每小时尿量不少于 30ml
C.有血红蛋白尿时，要碱化尿液 D.电解质液最好选用生理盐水
E.以上均正确

24.以下哪些物品属于损伤性废物

- A.手术锯 B.玻璃安瓿 C.医用针头，缝合针
D.备皮刀 E.玻璃试管

25.患者，女，42岁，因绞窄性肠梗阻行“回肠部分切除术”，术后5d，患者出现腹痛、以脐周最明显，腹腔引流管引流出血性液体每天约200ml，体检：体温38.5℃，呼吸22次/分，脉搏95次/分，血压135/76mmHg。腹胀，脐周压痛，未触及肿块，肠鸣音弱。血常规 $13.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例为0.83。下列关于该患者的护理正确的是

- A.禁食，胃肠减压 B.给予654-2止痛 C.低半坐位
D.及时准确记录出入量 E.应用抗菌药物预防感染

26.关于急腹症的诊断中，下列哪些是正确的

- A.胃、十二指肠溃疡急性穿孔，腹部透视膈下可无游离性气体
B.在患者所指疼痛部位有局限性压痛时，基本上是该部位内脏的疾病
C.让患者咳嗽时感觉上腹疼痛不一定意味着是上腹部炎症性疼痛
D.血、尿淀粉酶正常不能否定急性胰腺炎的诊断
E.以上都正确

27.患者脑室引流后3h，引流管无脑脊液流出，下列护理措施正确的是

- A.用无菌注射器轻轻向外抽吸 B.报告医生
C.轻轻旋转引流管 D.生理盐水冲洗 E.必要时换管

28.肺癌患者手术后的护理措施错误的是

- A.给予吸氧 B.鼓励患者早期下床活动
C.肺段切除者选择健侧卧位 D.全肺切除者选择健侧卧位
E.有血痰或支气管瘘者取健侧卧位

29.食管癌患者于术后的护理措施正确的是

- A.禁食1d B.肛门排气后进普食 C.饭后立即平卧
D.少食多餐 E.早期避免进食生、冷、硬的食物

30.腰椎间盘突出症术后患者的潜在并发症包括

- A.脑脊液漏出 B.尿潴留 C.感觉障碍
D.运动障碍 E.喉返神经损伤

三、问答题（每题20分，共60分）

1.患者张某，男，73岁，休克，快速补液至2000ml时，出现呼吸困难，咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，肺内布满湿啰音。请回答：

- (1) 试判断该患者发生何种情况。(3分)

(2) 护理措施是什么? (12 分)

(3) 应如何预防上述情况的发生? (5 分)

2.患者,男,70岁。数月来头晕、乏力、心悸,近一周发生两次晕厥。护理体检:血压170/85mmHg,心率为50次/min,节律规则,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。心电图检查为窦性心动过缓,Holter检查示24h内发生3次长间歇,分别为4.5s,4.8s,6s,长间歇内无P波存在。请回答:

(1) 综合考虑,导致该患者发生晕厥的原因最可能是何种心律失常?(4分)

(2) 根据以上评估资料,列出该患者的护理诊断。(列出2个即可,共6分)

(3) 列出针对该患者的护理措施。(4分)

(4) 为防止再次发生晕厥,对该患者采取最佳的非药物治疗措施是什么?施行此治疗,护士需采取的护理措施是什么?(6分)

3.患者,女,45岁,4个月前无意中发现有乳外上象限一无痛性肿块,肿块起初较小,近1个月来生长较快,遂就诊,体检:两侧乳房大小对称,外形无改变,无乳头溢液,右侧可扪及一5cm×3cm的质硬肿块,边界不清,表面不光滑,活动度尚可,右侧腋窝可触及多个散在可以推动的淋巴结。请回答:

(1) 该患者可能的诊断是什么?为了进一步明确诊断应再做哪一项检查?最根本的治疗方案是什么?(3分)

(2) 术后应如何做好伤口的护理?(3分)

(3) 如何指导患者术后患肢功能锻炼?(4分)

(4) 请详细描述如何指导患者乳房自我检查。(3分)

(5) 术后如何预防患侧上肢肿胀?(4分)

(6) 如何对术后准备出院的患者进行健康教育?(3分)