

第十二章 理血剂

习题

一、A1型题

- 具有逐瘀泻热功用的方剂是（ ）
A.复元活血汤 B.血府逐瘀汤 C.桃核承气汤
D.补阳还五汤 E.生化汤
- 桃核承气汤的组成含有（ ）
A.大承气汤 B.小承气汤 C.调胃承气汤
D.增液承气汤 E.复方大承气汤
- 桃核承气汤的组成中不含有（ ）
A.桃仁 B.桃核 C.大黄
D.芒硝 E.桂枝
- 桃核承气汤中的君药是（ ）
A.桃仁、桂枝 B.大黄、桂枝 C.桃仁、芒硝
D.桃仁、大黄 E.大黄、芒硝
- 血府逐瘀汤主治的病证是（ ）
A.膈下血瘀证 B.少腹血瘀证 C.胸中血瘀证
D.两胁血瘀证 E.头部血瘀证
- 血府逐瘀汤的君药是（ ）
A.当归、川芎 B.川芎、柴胡 C.桃仁、红花
D.柴胡、枳壳 E.生地、赤芍
- 由桃仁、红花、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、当归、枳壳、甘草组成的方剂是（ ）
A.少腹逐瘀汤 B.复元活血汤 C.通窍活血汤
D.血府逐瘀汤 E.膈下逐瘀汤
- 患者胸部刺痛，固定不移，心悸失眠，舌有瘀斑，脉弦紧。治宜首选（ ）
A.桃红四物汤 B.丹参饮 C.复元活血汤
D.血府逐瘀汤 E.膈下逐瘀汤
- 补阳还五汤原书用黄芪的量是（ ）
A.一两 B.二两 C.三两
D.四两 E.五两
- 组成中含有地龙的方剂是（ ）
A.血府逐瘀汤 B.补阳还五汤 C.复元活血汤
D.温经汤 E.膈下逐瘀汤
- 补阳还五汤的功用（ ）
A.补气，活血，养血 B.补气，活血，通络 C.补气，活血，行气
D.行气，疏肝，通络 E.行气，止痛，活血
- 在补阳还五汤的主治证中，下列哪一项是错误的（ ）
A.半身不遂 B.口眼喎斜 C.语言謇涩

- 24.失笑散的主治证候不包括（ ）
 A.心腹刺痛 B.产后恶露不行 C.月经不调
 D.少腹急痛 E.胸痛头痛
- 25.桂枝茯苓丸的功用是（ ）
 A.温经通阳，健脾益气 B.健脾利水，解肌发表
 C.活血祛瘀，健脾利水 D.活血化瘀，缓消瘕块
 E.消藏除痞，益气温阳
- 26.桂枝茯苓丸的主治证是（ ）
 A.瘀阻胞宫证 B.下焦蓄血证 C.中风后遗症
 D.瘀滞脉络证 E.产后血虚寒凝证
- 27.妇人素有癥块，妊娠漏下不止，血色紫黑晦暗，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩者。治宜首选（ ）
 A.血府逐瘀汤 B.复元活血汤 C.生化汤
 D.温经汤 E.桂枝茯苓丸
- 28.十灰散的功用是（ ）
 A.凉血活血 B.凉血补血 C.补血调血
 D.凉血止血 E.凉血清热
- 29.十灰散主治证的病机是（ ）
 A.血热妄行，损伤血络 B.血热妄行，瘀血内停
 C.肝火犯肺，损伤血络 D.脾阳不足，统摄失常
 E.冲任虚寒，血不内守
- 30.十灰散主治出血证，下列哪一项不宜使用（ ）
 A.吐血 B.便血 C.咯血
 D.嗽血 E.衄血
- 31.十灰散中用大黄的主要作用是（ ）
 A.泻下热结 B.泻热通便 C.活血祛瘀
 D.清热泻火，导热下行，止血 E.清热凉血
- 32.咳血方的组成中有（ ）
 A.瓜蒌仁 B.桔梗 C.杏仁
 D.白茅根 E.生地
- 33.水火刑金而致的咳血证，治疗宜选（ ）
 A.十灰散 B.四生丸 C.咳血方
 D.槐花散 E.金铃子散
- 34.咳血方主治证的病机是（ ）
 A.血热妄行，损伤血络 B.阴虚火旺，损伤脉络
 C.肝火犯肺，灼伤肺络 D.脾阳不足，统摄失常
 E.心脾两虚，气血不足
- 35.患者咳痰带血，咳吐不爽，心烦易怒，胸胁作痛，咽干口苦，颊赤便秘，舌红苔黄，脉弦数。治宜首选（ ）
 A.龙胆泻肝汤 B.左金丸 C.槐花散
 D.咳血方 E.泻白散

- C.活血祛瘀，通络止痛
E.活血祛瘀，凉血止痛
- 3.血府逐瘀汤的功用是（ ）
- 4.复元活血汤的功用是（ ）
- A.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、柴胡
B.川芎、赤芍、当归尾、桃仁、红花、黄芪
C.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、穿山甲
D.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、瓜蒌根
E.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、大黄
- 5.血府逐瘀汤的组成中含有（ ）
- 6.补阳还五汤的组成中含有（ ）
- A.冲任虚寒，瘀血阻滞证
B.产后血虚寒凝，瘀血阻滞证
C.瘀阻胞宫证
D.气滞血瘀证
E.寒凝血滞，脉络瘀阻证
- 7.温经汤的主治证是（ ）
- 8.生化汤的主治证是（ ）
- 9.桂枝茯苓丸的主治证是（ ）
- A.大蓟、小蓟
B.青黛、栀子
C.小蓟、当归
D.栀子、蒲黄
E.大黄、栀子
- 10.十灰散的君药是（ ）
- 11.咳血方的君药是（ ）
- A.小蓟饮子
B.槐花散
C.黄土汤
D.咳血方
E.十灰散
- 12.尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数。治宜首选（ ）
- 13.便血，血色鲜红，舌红，苔黄，脉数。治宜首选（ ）
- 14.大便下血，先便后血，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。治宜首选（ ）

三、X型题

- 1.桃核承气汤的组成中含有（ ）
- A.大黄
B.桃仁
C.桂枝
D.甘草
E.芒硝
- 2.组成中含有大黄的方剂是（ ）
- A.桃核承气汤
B.血府逐瘀汤
C.复元活血汤
D.十灰散
E.小蓟饮子
- 3.血府逐瘀汤是由哪些基础方加桔梗、牛膝而成的（ ）
- A.四逆汤
B.桃红四物汤
C.四逆散
D.四君子汤
E.当归四逆汤
- 4.具有活血祛瘀功用的方剂是（ ）
- A.血府逐瘀汤
B.复元活血汤
C.十灰散
D.失笑散
E.小蓟饮子
- 5.补阳还五汤的功用是（ ）

- A.补气 B.活血 C.补阳
D.通络 E.止痛
- 6.补阳还五汤中黄芪的作用是（ ）
A.补益元气 B.升阳举陷 C.固表止汗
D.气旺则血行 E.益肺利水
- 7.复元活血汤中的君药是（ ）
A.柴胡 B.瓜蒌根 C.当归
D.大黄 E.穿山甲
- 8.温经汤的组成中有（ ）
A.吴茱萸 B.山茱萸 C.丹皮
D.丹参 E.麦冬
- 9.温经汤的功用是（ ）
A.补血调经 B.温经散寒 C.补血行气
D.养血祛瘀 E.温经止痛
- 10.生化汤重用当归的意义是（ ）
A.补血活血 B.化瘀生新 C.行滞止痛
D.补血安胎 E.活血调经
- 11.桂枝茯苓丸的药物组成是（ ）
A.桂枝 B.茯苓 C.丹皮
D.桃仁 E.芍药
- 12.鳖甲煎丸的功用是（ ）
A.行气活血 B.祛湿化痰 C.软坚消癥
D.行气利水 E.消积化瘀
- 13.具有凉血止血功用的方剂是（ ）
A.十灰散 B.咳血方 C.小蓟饮子
D.七厘散 E.胶艾
- 14.应用咳血方的辨证要点是（ ）
A.咳痰带血 B.胸胁作痛 C.头痛目赤
D.舌红苔黄 E.脉弦数
- 15.当归在小蓟饮子中的作用是（ ）
A.养血和血 B.引血归经 C.防诸药寒凉滞血
D.补血活血 E.调经止痛
- 16.槐花散的功用是（ ）
A.凉血止血 B.清肠止血 C.清热泻火
D.疏风行气 E.疏风解表
- 17.黄土汤的配伍特点是（ ）
A.止血防瘀 B.寒热并用 C.标本兼顾
D.刚柔相济 E.升降同施

一、A1型题

- 1.C.桃核承气汤以桃仁、大黄为君，配芒硝、桂枝、甘草而成，故具有逐瘀泻热的功用。
- 2.C.桃核承气汤是由调胃承气汤减芒硝之量，加桃仁、桂枝而成。
- 3.B.桃核承气汤组咸中之“桃核”即“桃仁”，其“核”字并非指桃核（胡桃）。
- 4.D.该方主治邪在太阳不解，随经入腑化热，与血热搏结于下焦之蓄血证；治当逐瘀泻热，用桃仁、大黄瘀热并治，共为君药。
- 5.C.血府逐瘀汤主治血瘀胸中，气机阻滞，清阳郁遏不升之胸痛、头痛日久不愈、痛如针刺等，故选胸中血瘀证。
- 6.C.血府逐瘀汤主治血瘀胸中，气机阻滞之胸痛证，以瘀血阻滞为主，故以桃仁破血行滞而润燥、红花活血祛瘀以止痛，共为君药。
- 7.D.血府逐瘀汤由四逆散+桃红四物汤+桔梗、牛膝组成，故选D。
- 8.D.血府逐瘀汤具有活血化瘀，行气止痛之功。主治胸中瘀血所致的胸部刺痛、固定不移等症，故选之。
- 9.D.王清任所创制的补阳还五汤由黄芪四两，当归尾二钱，赤芍一钱半，地龙一钱，川芎一钱，红花一钱，桃仁一钱组成，故选之。
- 10.B.补阳还五汤由黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁组成，故选之。
- 11.B.补阳还五汤中重用黄芪补气，桃仁、红花等活血祛瘀，地龙通络，共呈补气活血通络之功。
- 12.D.补阳还五汤主治证乃因气虚脉络瘀阻所致，症见半身不遂、口眼喎斜、语言蹇涩、口角流涎等。因此，主治证中不包括“谵语烦渴”之心经有热之症状。
- 13.B.复元活血汤主治跌打损伤，瘀血留于胁下，痛不可忍者。
- 14.C.复元活血汤为治跌打损伤之瘀血证，故大黄酒制为宜，以增其活血祛瘀之力。
- 15.C.温经汤由吴茱萸、桂枝、当归、川芎、阿胶等组成。以吴茱萸、桂枝为君，温经散寒之力颇著；用当归、川芎为臣，养血活血调经之力亦佳，故其病机应为冲任虚寒，瘀血阻滞。
- 16.C.温经汤是由吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬组成的。
- 17.D.温经汤以吴茱萸、桂枝为君，当归、川芎为臣，并与丹皮、麦冬、半夏等相配，故具有温经散寒、祛瘀养血的功用。
- 18.A.此为冲任虚寒，瘀血阻滞证。温经汤功能温经散寒，祛瘀养血，是冲任虚寒而有瘀滞之月经不调的常用方。
- 19.E.生化汤由当归、川芎、炮姜、桃仁、甘草组成。
- 20.C.生化汤以全当归为君，并配川芎、桃仁、炮姜等，故具有养血祛瘀、温经止痛之功。
- 21.C.生化汤功能养血祛瘀，温经止痛。主治产后血虚寒凝，瘀血内阻之恶露不行、小腹冷痛。
- 22.A.失笑散具有活血祛瘀，散结止痛之功。其病机应为瘀血内停，脉道阻滞。
- 23.C.失笑散由五灵脂、蒲黄组成，具有活血祛瘀、散结止痛之功。
- 24.E.失笑散主治瘀血内停，脉道阻滞所致之心腹刺痛，或产后恶露不行，或月经不调，少腹急痛。
- 25.D.桂枝茯苓丸以桂枝为君，配丹皮、桃仁、茯苓、芍药，故有活血化瘀、缓消癥块之功。
- 26.A.桂枝茯苓丸以桂枝、丹皮、桃仁、茯苓、芍药等组成，具有活血化瘀、缓消癥块的作用，故可治瘀阻胞宫证。
- 27.E.桂枝茯苓丸具有活血化瘀，缓消癥块之功。主治妇人素有癥块，妊娠漏下不止，或胎动不安，血色紫黑晦暗，腹痛拒按，或经闭腹痛，或产后恶露不尽而腹痛拒按，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩者。
- 28.D.十灰散以大蓟、小蓟凉血止血为君，再配以梔子、大黄等大量清热泻火之品，故有凉血止血的功用。
- 29.A.十灰散是由大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜根、山梔、大黄、牡丹皮、棕榈皮等药组成。具有凉血止血

之功用，故其主治证的病机应为血热妄行，损伤血络。

30.B.十灰散主治火热炽盛，气火上冲，损伤血络，离经妄行之上部出血证，故便血者不宜使用。

31.D.本方诸药烧灰存性，血见黑则止，故大黄的作用应为清热泻火、导热下行、止血。

32.A.咳血方是由青黛、瓜蒌仁、海粉、山栀子、诃子组成的。

33.C.咳血方以青黛、栀子清肝泻火，凉血止血为君。具有清肝宁肺，凉血止血之功。故可用于木火刑金而致的咳血证。

34.C.咳血方以青黛、栀子、瓜蒌仁、海粉、诃子等组成。因方以善于清肝泻火，凉血止血之青黛、栀子为君，具有清肝宁肺、凉血止血之功，故主治证的病机应为肝火犯肺、损伤肺络。

35.D.此为肝火犯肺，灼伤肺络证。咳血方具有清肝宁肺、凉血止血之功，为治木火刑金的咳血常用方。

36.B.小蓟饮子由生地、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶等药组成。故具有凉血止血，利水通淋之功用。

37.C.小蓟饮子以小蓟为君，具有凉血止血、利水通淋之功。临床用于尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数之症。

38.C.六一散由滑石、甘草组成。而小蓟饮子由生地黄、小蓟、滑石、木通、蒲黄、藕节、淡竹叶、当归、栀子、甘草组成，含有六一散组成。

39.E.槐花散是由槐花、枳壳、侧柏叶、荆芥穗组成。

40.A.槐花散以槐花为君，配荆芥、枳壳、侧柏叶等，故具有清肠止血、疏风行气之功。

41.C.槐花散具有清肠止血、疏风行气之功，可用于治疗肠风、脏毒之下血证。

42.B.黄土汤以灶心黄土为君，配附子、阿胶等组成，故具有温阳健脾、养血止血之功。

43.C.黄土汤以灶心黄土为君，配附子、阿胶、白术等药组成。具有温阳健脾，养血止血之功。故其病机应为脾阳不足，统摄无权。

44.E.黄土汤以灶心黄土为君，配附子、阿胶、白术等药组成。具有温阳健脾，养血止血之功。其所治的便血、崩漏应属脾阳不足，统摄无权所致。

45.E.黄土汤主治脾阳不足，统摄无权之便血、崩漏，故其辨证要点应为血色暗淡、舌淡苔白、脉沉细无力。

二、B1 型题

1.A.桃核承气汤是以桃仁、大黄活血祛瘀，下瘀泻热为君组成方剂。其功用为逐瘀泻热。

2.E.十灰散以大蓟、小蓟为君长于凉血止血，故具有凉血止血作用。

3.A.血府逐瘀汤由桃红四物汤+四逆散+桔梗、牛膝组成，具有活血祛瘀、行气止痛之功。

4.D.复元活血汤由柴胡、瓜蒌根、当归、红花、甘草、穿山甲、大黄、桃仁组成，具有活血祛瘀、疏肝通络之功。

5.A.血府逐瘀汤由桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草组成。

6.B.补阳还五汤由黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁组成。

7.A.温经汤具有温经散寒、祛瘀养血之功用，故可治冲任虚寒、瘀血阻滞证。

8.B.生化汤具有养血祛瘀、温经止痛之功用，故可治产后血虚寒凝、瘀血阻滞证。

9.C.桂枝茯苓丸具有活血化瘀、缓消癥块之功用，故可用治瘀阻胞宫证。

10.A.十灰散主治血热妄行之出血证，故方中以大蓟、小蓟长于凉血止血，且能祛瘀为君。

11.B.咳血方主治肝火犯肺之咳血证，故方中以青黛、栀子清肝泻火、凉血止血为君。

12.A.小蓟饮子具有凉血止血，利水通淋之功。主治热结下焦之尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数之证。

13.B.槐花散具有清肠止血，疏风行气之功。临床治疗便血，血色鲜红或晦暗，舌红，苔黄，脉数者。

14.C.黄土汤具有温阳健脾，养血止血之功。临床治疗大便下血，先便后血，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力者。

三、X型题

- 1.ABCDE.桃核承气汤是由桃仁、大黄、桂枝、甘草、芒硝组成的。
- 2.ACD.桃核承气汤由桃仁、大黄、桂枝、甘草、芒硝组成；复元活血汤由柴胡、瓜蒌根、当归、红花、甘草、穿山甲、大黄、桃仁组成；十灰散由大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、白茅根、茜草根、栀子、大黄、丹皮、棕榈皮组成。三方的组成中均含大黄。
- 3.BC.血府逐瘀汤是四逆散+桃红四物汤+桔梗、牛膝组成的。
- 4.ABD.血府逐瘀汤、复元活血汤、失笑散三方均由桃仁、红花，或穿山甲，或五灵脂等活血祛瘀药物为主组成，故均有活血祛瘀之功。
- 5.ABD.补阳还五汤的功用是补气，活血，通络。
- 6.AD.补阳还五汤中黄芪的作用是补益元气，意在气旺则血行，瘀去则络通。
- 7.AD.复元活血汤用酒制大黄荡涤凝瘀败血，导瘀下行；柴胡疏肝行气，并可引诸药入肝经共为君药。
- 8.ACE.温经汤是由吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬组成。
- 9.BD.温经汤是由吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬组成，故具有温经散寒、养血祛瘀之功。
- 10.ABC.生化汤中重用当归补血活血，化瘀生新，行滞止痛为君药。
- 11.ABCDE.桂枝茯苓丸是由桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、芍药组成的。
- 12.ABC.鳖甲煎丸以鳖甲、赤硝、大黄、廑虫等组成，具有行气活血、祛湿化痰、软坚消癥之功。
- 13.ABC.十灰散、咳血方、小蓟饮子三方均有凉血止血之功。
- 14.ABDE.咳血方具有清肝宁肺，凉血止血之功。主治肝火犯肺之咳血证，故以咳痰带血、胸胁作痛、舌红苔黄、脉弦数为辨证要点。
- 15.ABC.小蓟饮子主治下焦瘀热，损伤膀胱脉络，气化失司之血淋、尿血证。故方中当归作用是养血和血，引血归经，并防诸药寒凉滞血。
- 16.BD.槐花散由槐花、侧柏叶、荆芥穗、枳壳组成，故具有清肠止血、疏风行气之功。
- 17.BCD.黄土汤由甘草、干地黄、地龙、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土组成，故具有寒热并用、标本兼顾、刚柔相济的配伍特点。