

全真模拟试卷（一）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 2 分，共 240 分）。

1. 系统论这一科学术语源自于
A. 弗里德里希·冯·哈耶克
B. 罗纳德·科斯
C. 贝塔朗菲
D. 莫里斯·阿莱斯
E. 米尔顿·弗里德曼
2. 下列属弗洛伊德三大理论要点之一的是
A. 意识层次理论
B. 性蕾期理论
C. 自我理论
D. 潜意识理论
E. 精神分析法
3. 下列哪种药物不是目前临床上应用的主要抗凝治疗药物
A. 普通肝素
B. 低分子量肝素
C. 华法林
D. 阿司匹林
E. 链激酶
4. 室性阵发性心动过速的首选药物是
A. 利多卡因
B. 苯妥英钠
C. 普罗帕酮
D. 胺碘酮
E. 维拉帕米
5. 我国现行的护理教育体系是
A. 中专、专升本、研究生
B. 中专，专科，本科
C. 专科、本科
D. 中专、专科、本科、研究生
E. 专科，本科、研究生
6. 我国急性胰腺炎最常见的病因为
A. 酗酒
B. 暴饮暴食
C. 胰管结石
D. 胆道系统疾病
E. 外伤
7. 尿毒症患者最早和最突出的临床表现是
A. 高血压
B. 高钠血症
C. 抽搐
D. 高钾或低钾血症
E. 厌食、恶心
8. 穿无菌衣和戴无菌手套后，必须保持无菌的部位是
A. 整个胸、腹、背部和双上肢
B. 整个颈、肩、胸、腹、背部
C. 腰部以上的前胸、后背和双上肢
D. 腰部以上的前胸和肩部
E. 腰部以上的前胸、侧胸和双上肢
9. 《护士伦理国际法》中规定护士的唯一任务是帮助患者
A. 促进健康
B. 维持健康
C. 恢复健康
D. 减轻痛苦
E. 延长生命
10. 护理学基本概念的核心是
A. 健康
B. 环境
C. 护理
D. 系统
E. 人
11. 对潜意识的正确理解是
A. 存在于前意识与意识之间
B. 指意识层次中较深的那一部分
C. 潜伏着的心理矛盾与障碍
D. 指人们深层的心理活动
E. 是人们没有意识到的深层的心理活动部分

12. 以下哪项不是椎管内麻醉中恶心呕吐的主要原因
- A. 麻醉平面过高致低血压引起脑缺氧
B. 迷走神经兴奋引起胃肠道蠕动增加
C. 患者对术中辅助用药较敏感
D. 局麻药误注入蛛网膜下腔
E. 手术牵拉腹腔内脏
13. 口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是
- A. 全身性感染
B. 发热
C. 呼吸困难、窒息
D. 吞咽困难
E. 化脓性海绵状静脉窦炎
14. 1992年，首家开设护理学硕士研究生教育的医学院校是
- A. 北京医科大学
B. 协和医科大学
C. 天津医科大学
D. 上海第二军医大学
E. 华西医科大学
15. 根据弗洛伊德的性心理学说，口欲期固结会产生
- A. 强迫性人格
B. 卫生习惯不良
C. 吸烟
D. 异食癖
E. 咬人
16. 根本性解决风湿性心脏瓣膜病的手段是
- A. 人工瓣膜置换术
B. 抗风湿治疗
C. 并发症治疗
D. 介入治疗
E. 抗凝治疗
17. 对甲状腺单发结节者，最应警惕甲状腺癌的年龄段为
- A. 儿童
B. 年轻男性
C. 妊娠妇女
D. 40岁以下妇女
E. 老年人
18. 目前地高辛用于治疗心力衰竭最常用的给药方法是
- A. 维持量法
B. 大剂量冲击疗法
C. 隔日疗法
D. 顿服法
E. 小剂量疗法
19. 皮亚杰的认知发展学说中前运算期指
- A. 0~7岁
B. 1~7岁
C. 2~7岁
D. 3~7岁
E. 4~7岁
20. 下列术前准备内容中错误的是
- A. 糖尿病患者控制血糖至正常范围
B. 纠正水电解质紊乱
C. 肝功能损害者，加强护肝治疗
D. 血压过高的患者术前应选用合适的降压药物
E. 纠正贫血和低蛋白血症
21. 皮亚杰认知发展阶段学说在护理工作中被广泛应用于
- A. 培养儿童的认知能力，正确对待疾病
B. 启发儿童摆脱自我为中心，配合治疗
C. 帮助儿童认识周围世界，熟悉病区环境
D. 避免抽象难懂的词句，增强与儿童的沟通
E. 提高儿童的逻辑思维能力，理解治疗意图
22. 肾移植术后24h内的正确卧位是
- A. 去枕平卧，头偏向一侧

- B.半坐卧位，移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C.侧卧位，移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- D.头低脚高位，移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- E.平卧位，移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$

23.系统的相关性表现为

- A.系统中作用弱的要素发生的功能或作用变化对系统整体无相关
- B.系统中作用强的要素发生的功能或作用变化对系统整体正相关
- C.系统中任何要素发生功能或作用的变化均引起其他要素乃至整体的相应变化
- D.系统中任何要素的功能与作用发生变化整体都可能产生相关反应
- E.系统中任何要素发生的功能或作用的变化都会引起其他要素的觉察与反应

24.马斯洛需要层次论认为个体首要满足的需要是

- A.安全需要 B.爱与归属的需要 C.生理需要
- D.自我实现的需要 E.自尊的需要

25.经治疗可得到有效逆转的是

- A.超急性排斥反应 B.急性排斥反应 C.加速血管排斥反应
- D.慢性排斥反应 E.亚急性排斥反应

26.Dunn（邓恩）于1961年提出

- A.适应模式 B.护理程序 C.整体护理
- D.最佳健康模式 E.人际关系模式

27.肝硬化患者全血细胞减少最主要的原因是

- A.慢性失血 B.骨髓造血功能障碍 C.营养障碍
- D.脾功能亢进 E.慢性溶血

28.毒蛇咬伤后为减慢毒素吸收应

- A.立即取坐位或卧位 B.立即甩动肢体 C.立即跑步到医院
- D.原地走动 E.患肢抬高

29.下列有关营养支持的叙述正确的是

- A.营养支持仅提供能量 B.营养支持仅提供蛋白质
- C.营养支持仅提供能量和蛋白质
- D.营养支持仅涉及营养素的代谢调理、药理和免疫作用
- E.营养支持不仅满足和提供患者能量及蛋白质的需要，还涉及代谢支持、营养素的代谢调理药理和免疫作用

30.有关结核菌素试验结果的判断方法正确的是

- A.注射后 24h 测量皮肤局部红晕直径 B.注射后 24h 测量皮肤局部硬块直径
- C.注射后 48h 测量皮肤局部红晕直径 D.注射后 72h 测量皮肤局部红晕直径
- E.注射后 72h 测量皮肤局部硬块直径

31.以下哪种心律失常患者听诊心律绝对规则

- A.室上性阵发性心动过速 B.心房颤动 C.心房扑动
- D.期前收缩 E.II度I型房室传导阻滞

32.代谢性酸中毒最突出的症状是

- A.呼吸深快，呼气时有酮味

- B.唇干舌燥，眼窝凹陷
 C.呼吸浅慢，呼气时有烂苹果气味
 D.心率加快，血压下降
 E.全身乏力，眩晕
- 33.喉上神经内支损伤的临床表现为
 A.饮水呛咳 B.音调降低 C.声音嘶哑
 D.吞咽困难 E.呼吸困难
- 34.诊断成人肺结核最可靠的依据是
 A.血沉增快 B.胸片有渗出性阴影 C.结核菌素试验阳性
 D.痰涂片检查结核菌阳性 E.低热、咳嗽、乏力、盗汗
- 35.为避免术中呕吐物误吸，小儿择期手术前应
 A.禁食（奶）禁饮 8~12h B.禁食（奶）禁饮 4~8h
 C.禁食（奶）8h，禁饮 2~4h D.禁食（奶）4~8h，禁饮 2~4h
 E.禁食（奶）4~8h，禁饮 2~3h
- 36.以下护理诊断问题应优先考虑
 A.急性意识障碍 B.潜在并发症：血容量不足
 C.组织灌注无效 D.心输出量减少 E.体液不足
- 37.下列胃镜检查术前护理错误的描述是
 A.向患者介绍检查的目的、方法 B.检测乙型、丙型肝炎病毒标志
 C.禁食 8h D.有幽门梗阻的患者禁食时间要更长
 E.遵医嘱给予地西洋、山莨菪碱或阿托品
- 38.尿毒症患者下列哪项临床表现主要是由肾脏内分泌功能障碍所致
 A.胃肠道症状 B.代谢性酸中毒 C.氮质血症
 D.神经症状 E.贫血
- 39.治疗性环境要求的适宜温度是
 A.16~20℃ B.18~22℃ C.22~24℃
 D.23~25℃ E.25~27℃
- 40.PIO 护理记录方式中“P”代表
 A.护理问题 B.措施 C.结果
 D.诊断 E.相关因素
- 41.异基因 HSCT 术后最严重的并发症是
 A.感染 B.出血 C.GVHD
 D.输血后肝炎 E.肝静脉闭塞病
- 42.流行性感冒主要的临床表现为
 A.上呼吸道症状较轻，发热和全身中毒症状较重
 B.上呼吸道症状较轻，发热和全身中毒症状也较轻
 C.上呼吸道症状较重，发热和全身中毒症状均较轻
 D.上呼吸道症状较轻，无发热和全身中毒症状
 E.无上呼吸道症状，发热和全身中毒症状较重

- 43.前列腺增生引起尿潴留的梗阻类型为
 A.动力性梗阻 B.机械性梗阻 C.上尿路梗阻
 D.下尿路梗阻 E.急性梗阻
- 44.特发性血小板减少性紫癜（ITP）的主要发病机制是
 A.骨髓巨核细胞成熟障碍 B.骨髓巨核细胞生成减少
 C.脾脏对血小板的破坏增多 D.自身免疫反应异常
 E.雌激素水平过高
- 45.对有面部红斑的系统性红斑狼疮的患者，错误的健康指导是
 A.经常用清水洗脸，每天3次 B.避免使用化妆品
 C.可外用皮质类固醇激素霜剂 D.禁止进紫外线消毒室
 E.以肥皂水清洗面部，每天3次
- 46.护士在执行护理计划前不需要考虑
 A.实施措施的人 B.实施措施的内容 C.技术和技巧
 D.实施措施的时间 E.预见和防止并发症
- 47.晨僵在哪类关节炎中表现最为突出
 A.骨性关节炎 B.类风湿关节炎 C.强直性脊柱炎
 D.感染性关节炎 E.风湿性关节炎
- 48.下面促进患者睡眠的措施中，不正确的是
 A.缓解疼痛 B.改变患者的睡眠习惯 C.消除焦虑
 D.舒适体位 E.创造良好的睡眠环境
- 49.被视为胰岛素增敏剂的药物为
 A.格列喹酮 B.格列苯脲 C.罗格列酮
 D.瑞格列奈 E.阿卡波糖
- 50.鉴别食管炎与早期食管癌的主要方法是
 A.胸骨灼痛 B.食管钡透黏膜紊乱 C.脱落细胞检查
 D.免疫诊断法 E.试验治疗
- 51.肾结核晚期的主要症状是
 A.全程血尿 B.脓尿 C.全身结核中毒症状
 D.膀胱刺激征 E.肾绞痛
- 52.根据护理程序评价结果，调整和修订护理计划不正确的是
 A.针对目标全部实现的护理诊断，停止相应护理措施
 B.针对目标部分实现的护理诊断，修订相关护理计划
 C.针对不存在的诊断，删除相关护理计划
 D.针对判断错误的诊断，修改相关护理计划
 E.针对未发现的护理诊断，增加相应的护理计划
- 53.多根多处肋骨骨折的主要影响是
 A.胸部疼痛 B.妨碍正常呼吸 C.痰不易咳出
 D.反常呼吸 E.骨折端摩擦
- 54.制定护理目标的原则为

- A.目标的主语可以是护理对象以外的人或物
B.目标必须现实、可行
C.目标不一定是通过护理措施所达到的
D.一个目标可以包括一个或多个行为动词
E.护理对象不能参与目标的制定
- 55.伴有出血倾向的血液病患者出现下列哪项症状时，要高度警惕颅内出血
A.高热 B.突发头痛 C.心悸气促
D.恶心呕吐 E.血压下降
- 56.腺垂体功能减退症替代治疗首先应使用的是
A.ACTH B.TSH C.性激素
D.甲状腺素 E.肾上腺皮质激素
- 57.下列哪项不是风湿病的共同特点
A.病程多呈急性 B.同一疾病表现可有很大差异
C.病程可有发作与缓解相交替 D.多有复杂的免疫学改变
E.对疗效有较大的个体差异
- 58.行胸腔闭式引流的患者下床活动时，引流瓶应低于
A.胸壁引流口平面 50Cm B.胸壁引流口平面 60~100Cm
C.膝关节 D.髌关节 E.大腿中部
- 59.收集资料的 5 个步骤依次是
A.收集资料、组织和整理资料、核实资料、分析资料、记录资料
B.组织和整理资料、收集资料、分析资料、核实资料、记录资料
C.收集资料、核实资料、组织和整理资料、分析资料、记录资料
D.收集资料、分析资料、核实资料、组织和整理资料、记录资料
E.收集资料、记录资料、分析资料、核实资料、组织和整理资料
- 60.现存的护理诊断常用的描述形式是
A.PC B.PE C.PES
D.P E.SE
- 61.患者进行日常活动既需要他人帮助，也需要设备或器械，其机体活动能力为
A.0 度 B.1 度 C.2 度
D.3 度 E.4 度
- 62.患者意识清楚，有能力变换体位，但因治疗需要而采取的体位是
A.习惯卧位 B.主动卧位 C.被动卧位
D.被迫卧位 E.特异性卧位
- 63.蛛网膜下腔出血最常见的病因是
A.血液系统疾病 B.先天性颅内动脉瘤 C.钩端螺旋体所致脑动脉炎
D.心脏病 E.神经胶质瘤
- 64.心搏骤停的早期主要诊断依据是
A.发绀 B.瞳孔散大 C.大动脉波动和神志消失
D.脑电波消失 E.心电图呈室颤

65. 下列哪种激素与人类神经系统发育最相关
 A. 生长激素 B. 甲状腺激素 C. 肾上腺素
 D. 肾上腺皮质激素 E. 胰岛素
66. 类风湿关节炎最常累及的关节为
 A. 肘关节 B. 四肢小关节 C. 膝关节
 D. 脊柱小关节 E. 肩关节
67. 对张力性气胸现场急救，首先应
 A. 厚敷料加压包扎 B. 闭式胸膜腔引流 C. 人工呼吸
 D. 胸腔穿刺排气 E. 快速输液、吸氧
68. SLE 患者典型的面部表现为
 A. 痤疮 B. 湿疹 C. 蝶形红斑
 D. 色素沉着 E. 紫癜
69. 下列哪项不是小脑幕切迹疝的常见症状
 A. 颅内压增高 B. 进行性意识障碍 C. 呼吸骤停发生早
 D. 瞳孔先缩小再散大 E. 频繁呕吐
70. 下列哪一型白血病最易并发 DIC
 A. 慢性粒细胞白血病 B. 急性早幼粒细胞白血病
 C. 急性粒单核细胞白血病 D. 急性单核细胞白血病
 E. 急性淋巴细胞白血病
71. 感染过程中，血液中最先出现的是
 A. 特异性 IgM 抗体 B. 特异性 IgA 抗体 C. 特异性 IgG 抗体
 D. 特异性 IgE 抗体 E. 特异性 IgD 抗体
72. 下列哪一型霍奇金病预后最差
 A. 淋巴细胞为主型 B. 结节硬化型 C. 混合细胞型
 D. 淋巴细胞削减型 E. 小淋巴细胞型
73. 下列哪种化疗药会引起周围神经炎
 A. 柔红霉素 B. 长春新碱 C. 羟基脲
 D. 全反式维甲酸 E. 阿糖胞苷
74. 慢粒可表现为
 A. 全血细胞的减少 B. 红细胞与血红蛋白量的增加
 C. 原始和早幼粒细胞显著增多 D. 中性杆状核和晚幼粒细胞显著增多
 E. 骨髓巨核细胞数显著增多
75. 某中年患者得知父亲突然患病，毅然出院照顾父亲，这种情况属于
 A. 角色行为消退 B. 角色行为冲突 C. 角色行为强化
 D. 角色行为异常 E. 角色行为缺如
76. “压力理论之父”是指
 A. 伯纳德 B. 席尔 C. 拉扎勒斯
 D. 霍姆斯 E. 拉赫
77. Chaffee 将评判性思维定义为一种

- A.认知过程 B.分析过程 C.判断过程
D.逻辑思维过程 E.综合思维过程
- 78.莱宁格在跨文化护理理论中主要阐明了
A.文化关怀是人类社会发展的基础 B.护士的职责是为患者提供适应的环境
C.专业关怀存在于日常生活中 D.关怀是护理活动的本质
E.护理关怀仅存在于护患关系中
- 79.住院处为患者办理入院手续的主要依据是
A.单位介绍信 B.转院证明 C.门诊病历
D.住院证 E.公费医疗单
- 80.对门诊就诊的患者首先应实行
A.心理安慰 B.卫生指导 C.预检分诊
D.查阅病案资料 E.健康教育
- 81.适用于口腔有溃烂、坏死组织的口腔护理液是
A.2%~3%硼酸溶液 B.生理盐水 C.0.02%呋喃西林溶液
D.1%~3%过氧化氢溶液 E.1%~4%碳酸氢钠溶液
- 82.对高热患者的护理，下列哪项不妥
A.密切观察病情变化 B.每天两次测体温 C.冰袋冷敷头部
D.口腔护理 E.鼓励多饮水
- 83.可导致脉率减慢的是
A.颅内高压 B.贫血 C.冠心病心绞痛
D.急性左心衰 E.心源性休克
- 84.下列影响冷疗的因素中，错误的是
A.冷疗的方法不同，效果也不同 B.冷疗效果与面积成正比
C.冷疗时间与效果成正比 D.不同个体对冷的反应不同
E.环境温度影响冷效应
- 85.下列哪种物质能够保护细胞膜，防治维生素 C 缺乏症
A.VitA B.VitB C.VitC
D.VitD E.VitE
- 86.尿潴留患者首次导尿放出的尿量不应超过
A.500ml B.800ml C.1000ml
D.1500ml E.2000ml
- 87.平静呼吸时，每次吸入或呼出呼吸器官的气量，称为
A.潮气量 B.每分通气量 C.肺泡通气量
D.有效通气量 E.最大通气量
- 88.下列最可能出现“三凹征”的是
A.咳嗽 B.咳痰 C.吸气性呼吸困难
D.呼气性呼吸困难 E.混合性呼吸困难
- 89.通过吸入组胺或乙酰胆碱后，进行呼吸道反应性测定的检查是
A.通气功能测定 B.支气管舒张试验 C.支气管激发试验

- D.最大呼气流量测定 E.最大呼气流量变异率测定
- 90.肺心病发生的先决条件是
A.缺氧 B.血液黏稠度增加 C.肺动脉高压形成
D.右心室肥大 E.右心功能不全
- 91.用 5IU 结素作结核菌素试验的主要目的是
A.测定人体是否受过结核菌感染 B.诊断是否患有肺结核
C.判断结核有无活动性 D.增强机体对结核菌的免疫力
E.明确肺结核患者是否需隔离治疗
- 92.干酪性肺炎和结核球属于肺结核中的哪种类型
A.原发型 B.血行播散型 C.浸润型
D.慢性纤维空洞型 E.结核性胸膜炎
- 93.肺癌的病理分型中最常见的是
A.鳞状上皮细胞癌 B.小细胞未分化癌 C.大细胞未分化癌
D.腺癌 E.细支气管肺泡癌
- 94.肺萎缩达 50%的自发性气胸的治疗应首选
A.鼻塞给氧 B.排气减压 C.镇静止痛
D.镇咳祛痰 E.手术治疗
- 95.Ⅱ型呼吸衰竭应给予吸氧的浓度是
A.<15% B.<30% C.30%~50%
D.50% E.>50%
- 96.慢性心功能不全患者长期服用噻嗪类利尿剂,应注意的不良反应是
A.低镁血症 B.低钠血症 C.脱水症
D.氮质血症 E.低钾血症
- 97.卡托普利治疗高血压的作用机制是
A.血管扩张药 B.钙离子阻滞剂 C.'肾上腺素受体阻滞剂
D.交感神经抑制剂 E.血管紧张素转化酶抑制剂
- 98.长期血压增高容易引起损害的器官是
A.心、脑、肾 B.心、脑、肺 C.心、肝、肾
D.脑、肾、肝 E.肝、肾、肺
- 99.在对安装人工起搏器患者的护理中,不正确的是
A.持续 24h 心电监护 B.平卧 24h,术侧卧位
C.术后第 4d 开始协助患者做术侧肩部活动 D.沙袋压迫伤口 4~6h
E.遵医嘱给予抗生素 3d
- 100.心肌梗死的心电图波形是
A.T 波高耸 B.S-T 段抬高 C.s-T 段压低
D.深而宽的 Q 波 E.T 波倒置
- 101.给心力衰竭患者输液,应严格限制滴速在
A.10~19 滴/min B.20~30 滴/min C.31~40 滴/min
D.41~50 滴/min E.61~70 滴/min

102.以减轻心脏前负荷为主的药物是

- A.多巴胺 B.硝酸甘油 C.洋地黄
D.哌唑嗪 E.肼屈嗪

103.对三度房室传导阻滞反复发作，并伴有阿-斯综合征者，首选的治疗是

- A.糖皮质激素 B.阿托品 C.异丙肾上腺素
D.安置人工心脏起搏器 E.麻黄碱

104.对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是

- A.血气分析 B.X 线检查 C.心电图检测
D.呼吸功能检测 E.血流动力学监测

105.急性呼吸窘迫综合征的最基本的病理改变是

- A.低氧血症 B.酸中毒 C.肺泡内及间质水肿
D.血管通透性增高 E.肺泡表面活性物质缺失

106.全脊髓麻醉的主要危险是

- A.低血压 B.剧烈头痛 C.麻醉作用持久
D.呼吸心搏骤停 E.损伤脊髓导致截瘫

107.通过中心静脉途径进行肠外营养支持的患者，估计其接受营养支持的时间至少应为

- A.1 周 B.2 周 C.3 周
D.4 周 E.5 周

108.溶血性链球菌感染所形成的脓液为

- A.黏稠无臭 B.黏稠恶臭 C.稀薄量多无臭
D.黏稠黄色无臭 E.稀薄棕色恶臭

109.口底、颌下和颈部患蜂窝组织炎时，护士应特别警惕患者是否并发了

- A.菌血症 B.喉头水肿 C.海绵状静脉窦炎
D.脓毒败血症 E.吞咽困难

110.毒蛇咬伤时的现场急救首先是

- A.高锰酸钾冲洗伤口 B.伤口上方捆扎 C.普鲁卡因局部封闭
D.扩大伤口使毒液外流 E.服用蛇药

111.属于器官移植慢性排斥反应的是

- A.术后 1~2 周内发生 B.突发寒战，高热 C.移植器官功能逐渐减退
D.移植器官肿大，局部疼痛 E.术后 24h 内发生

112.乳癌根治术后，为预防皮下积液及皮瓣坏死的主要措施是

- A.半卧位 B.引流管持续负压吸引 C.加压包扎伤口
D.抬高同侧上肢 E.局部沙袋压迫

113.腹外疝环是指

- A.疝内容物突出的部分 B.疝外被盖组织 C.腹壁缺损或薄弱处
D.腹膜壁层的一部分 E.疝囊颈部

114.护士经常用到的评判性思维的评价标准可分为

- A.一类 B.二类 C.三类
D.四类 E.五类

115.我国第一个全国性的关于医疗事故处理问题的行政法规颁布于

- A.1987年
- B.1980年
- C.1989年
- D.1992年
- E.1994年

116.为患者进行灌肠时，应协助患者采取的卧位是

- A.侧卧位
- B.俯卧位
- C.去枕仰卧位
- D.头高足低位
- E.头低足高位

117.下列消毒剂中属于气体杀菌剂的是

- A.甲醛
- B.环氧乙烷
- C.过氧乙酸
- D.乙醇
- E.戊二醛

118.脉搏短绌常见于

- A.发热患者
- B.房室传导阻滞患者
- C.洋地黄中毒患者
- D.心房纤维颤动患者
- E.甲状腺功能亢进患者

119.化学制冷袋维持时间为

- A.1h
- B.2h
- C.3h
- D.4h
- E.5h

120.低盐饮食每日食盐不可超过

- A.1g
- B.2g
- C.3g
- D.4g
- E.5g

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.人际关系的选择原则包括

- A.择善原则
- B.择优原则
- C.调衡原则
- D.文明原则
- E.理解原则

2.特发性炎症性肌病包括

- A.PM
- B.DM
- C.包涵体肌炎
- D.重症肌无力
- E.肌营养不良症

3.主动-被动型护患关系模式包括下列哪些特点

- A.单向性关系
- B.心理方位为显著差位
- C.护士在护患关系中占主导地位
- D.护士为服务对象做什么
- E.以生物医学模式及疾病的护理为主导思想

4.共同参与型护患关系模式包括下列哪些特点

- A.双向性关系
- B.心理方位为等位
- C.护士在护患关系中占主导地位
- D.护士帮助服务对象自我恢复
- E.以生物医学-社会心理模式及健康为主导思想

5.关于 Broca 失语的特点正确的是

- A.病变位于优势半球额下回后部
- B.病变位于优势半球额下回中部
- C.非流利型口语，语量少，找词困难
- D.口语理解相对好
- E.复述不同程度受损

6.治疗脑脊液鼻漏，以下正确的处理是

- A.注射抗生素 B.鼻腔填塞 C.卧床休息
D.抬高床头 E.应用镇静剂

7.下列肝性脑病的防治措施，哪些是正确的

- A.低蛋白饮食 B.稀释肥皂水灌肠以保持大便通畅
C.静脉使用乙酰谷酰胺或谷氨酸钠降低血氨 D.口服诺氟沙星抑制肠道细菌
E.使用肝安静滴

8.适用于呼吸道隔离的传染病是

- A.霍乱 B.伤寒 C.麻疹
D.流行性脑脊髓膜炎 E.钩端螺旋体病

9.预防静脉血栓形成的护理措施有

- A.协助长期卧床患者定时翻身
B.避免过度曲髋
C.避免同一静脉.同一部位反复穿刺
D.输注刺激性药物时，防止药液渗出血管外
E.避免穿紧身衣物

10.腺体性脑积水的临床表现有

- A.落日征 B.叩诊破罐音 C.头围增大
D.颅缝增宽 E.智力障碍

11.乙型肝炎的传播途径包括

- A.消化道传播 B.日常生活密切接触 C.注射途径
D.输血或血制品 E.母婴传播

12.血液病患者易于继发感染的部位主要有

- A.咽峡部 B.口腔黏膜 C.呼吸道
D.肛周 E.皮肤黏膜

13.下列哪些药物是促胰岛素分泌剂

- A.格列本脲（优降糖） B.格华止 C.罗格列酮
D.瑞格列奈（诺和龙） E.阿卡波糖（拜糖平）

14.代谢性酸中毒的治疗包括

- A.积极的病因治疗 B.轻度酸中毒常不必使用碱性药物
C.经计算的补碱量应一次性快速输入 D.纠正酸中毒后应适当补钾
E.碱性药物的使用应根据有关的检测结果进行调节

15.外科最常见的水电解质和酸碱失衡是

- A.等渗性脱水 B.呼吸性碱中毒 C.呼吸性酸中毒
D.代谢性酸中毒 E.低钾血症

16.社会认知的偏差包括

- A.首因效应 B.近因效应 C.晕轮效应
D.装饰效应 E.社会固定印象

17.糖尿病最重要的微血管病变是

- A.心肌组织 B.视网膜 C.肾
D.神经 E.脑
- 18.下列哪些表现或指标有助于贫血严重程度的判断
A.呼吸困难 B.心悸 C.头晕
D.脸色苍白 E.外周血血红蛋白浓度
- 19.急性肾衰竭少尿期水电解质，酸碱失衡类型有
A.水中毒 B.高血钾 C.低血钠
D.代谢性酸中毒 E.低血磷
- 20.在 MODS 的预防中，维持有效循环和呼吸功能的基本措施是
A.换气 B.吸氧 C.输液
D.输血 E.维持循环泵功能
- 21.西方学者卡渤认为护理学的知识包括
A.个人知识 B.美学知识 C.医学知识
D.伦理学知识 E.科学知识
- 22.以下哪些表现为压疮第三期的临床表现
A.局部皮肤出现红、肿、热、痛 B.局部皮肤呈紫红色
C.局部皮肤形成水疱 D.真皮层有黄色渗出液
E.表皮水疱扩大，破溃
- 23.下列关于肌肉等张练习的描述，正确的是
A.等张练习有利于改善肌肉的神经控制
B.等张练习可遵循大负荷、少重复次数、快速引起疲劳的原则进行
C.等张练习可采用“渐进抗阻练习法”的方案进行
D.肌肉运动符合大多数日常活动的肌肉运动方式
E.等张练习又称静力练习
- 24.对肺结核患者的护理措施包括
A.指导患者咳嗽时应用餐巾纸遮住口鼻
B.装痰液的痰杯内加入少量 1%消毒灵浸泡半小时
C.接触痰液的手用流动水清洗
D.督促密切接触者去医院检查治疗
E.护理未进行规则化疗患者时戴口罩
- 25.肺癌局部扩散引起的临床表现有
A.胸痛 B.呼吸困难 C.咽下困难
D.声音嘶哑 E.上腔静脉阻塞综合征
- 26.关于重度 COPD 的肺功能测定，正确的是
A. $FEV_1/FVC < 70\%$ B. $50\% \leq FEV_1 < 80\%$ 预计值
C. $30\% \leq FEV_1 < 70\%$ 预计值 D. $FEV_1 \geq 80\%$ 预计值
E. $FEV_1 < 30\%$ 预计值
- 27.可作为急性肾衰竭患者少尿期输液量是否适当的评价指标是
A.体重每日减轻 0.5kg B.CVP 在正常水平 C.血钾恢复正常

D.无呼吸困难肺水肿 E.血钠维持在 130mmol/L 以上

28.弥散性血管内凝血不可缺少的化验有

A.血小板计数 B.纤维蛋白原定量 C.凝血酶原时间

D.红细胞比容测定 E.鱼精蛋白副凝试验

29.与硬膜外麻醉相比，蛛网膜下腔麻醉的特点是

A.并发症较多 B.多用于上腹部手术 C.可发生麻醉后头痛

D.只用于较短时间的手术 E.有发生全脊椎麻醉的危险

30.关于心理防御机制的描述正确的是

A.是心理不正常的人的心理活动

B.可见于正常人的心理活动

C.如果过度使用，会出现病态人格

D.升华，幽默的防御机制常能奏效

E.多数防御机制的作用是暂时的