

全真模拟试卷（三）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

1. 护理艺术、技能及行为方面的知识称为
A. 个人知识 B. 美学知识 C. 行为知识
D. 伦理学知识 E. 科学知识
2. 某癌症患者在检查过程中发现患有艾滋病，对此患者的护理中违反伦理要求的是
A. 像对待其他患者一样，一视同仁
B. 尊重患者，注重心理护理
C. 认真观察患者病情
D. 以该患者为例大力宣传艾滋病的知识
E. 主动接近患者，鼓励患者积极配合治疗
3. 心包腔内液体的生理作用是
A. 维持心包腔内压力 B. 润滑作用 C. 营养心肌
D. 免疫作用 E. 维持心肌张力
4. 患者住院期间，病案中排列在最前面的是
A. 医嘱单 B. 体温单 C. 入院记录
D. 门诊病历 E. 住院病案首页
5. 个体对他人、自己及人际关系的心理状态、行为动机和意向做出的推测与判断过程，称为
A. 社会认知 B. 社会推断 C. 社会评价
D. 人际判断 E. 人际评估
6. 海因提出沟通的基本要素有
A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个
D. 6 个 E. 7 个
7. 急性肾衰病人少尿期饮食护理，下列哪项错误
A. 限制饮水 B. 低蛋白 C. 富含维生素
D. 以糖为主 E. 多吃水果
8. 甲亢患者不宜进食的食物是
A. 高糖的食物 B. 高碘的食物 C. 高钾的食物
D. 高磷的食物 E. 高蛋白质的食物
9. 书写病室交班报告应先书写
A. 危重患者 B. 转入患者 C. 手术患者
D. 出院患者 E. 新入院患者
10. 根据纽曼的健康系统模式，以下哪项是正确的描述
A. 抵抗线位于正常防线之外 B. 正常防线紧贴机体基本结构
C. 弹性防线紧贴于抵抗线 D. 正常防线紧贴于抵抗线外
E. 基本结构处于非核心部分
11. 下列关于规范伦理学的叙述不正确的是

- A.立足于价值及其规范的研究
B.为各种正当的行为提供行动指南
C.其目的是教导人们在生活中如何应用恰当的理论、原则和规则
D.对道德行为和信念体系在社会间的差异进行经验性描述和再现的伦理学
E.它与个人的道德、价值观和社会的风俗、价值观密切相关
- 12.法的本质是
A.全社会的意志 B.统治者的意志 C.统治阶级的意志
D.上升为国家意志的统治阶级的意志 E.管理者的意志
- 13.下列属于心理环境范畴的是
A.人的循环系统功能情况 B.精神紧张程度 C.大气污染程度
D.人的教育程度 E.医院标识的情况
- 14.下列不属于医院社会环境调控范畴的是
A.人际关系 B.工作态度 C.病友关系
D.医院规则 E.病室装饰
- 15.对高渗性脱水病人执行输液治疗时，应首先输入
A.等渗盐水 B.5%葡萄糖液 C.平衡液
D.右旋糖酐 E.林格液
- 16.对颅脑损伤病人测量生命体征的顺序应该是
A.呼吸>脉搏>血压>意识 B.脉搏>呼吸>血压>意识
C.意识>呼吸>脉搏>血压 D.意识>脉搏>呼吸>血压
E.呼吸>意识>脉搏>血压
- 17.不舒适的最严重形式是
A.恐惧 B.烦躁 C.失眠
D.疼痛 E.疲乏
- 18.引起神经性疼痛的因素为
A.物理性因素 B.化学性因素 C.生物性因素
D.心理性因素 E.机械性因素
- 19.为限制患者手腕和踝部的活动，可用宽绷带打成
A.外科结 B.死结 C.滑结
D.单套结 E.双套结
- 20.使用约束具时，应注意使患者肢体处于
A.患者舒适的位置 B.患者喜欢的位置 C.接受治疗的强迫位置
D.容易变换的位置 E.功能位置
- 21.以下关于义齿的护理不正确的是
A.义齿的刷牙方法与真牙相同
B.患者晚间休息时应将义齿取下
C.义齿取下后，应按摩牙龈部位
D.取下的义齿应浸没于贴有标签的热水中
E.患者戴上义齿前，应对患者口腔进行清洁

22. 静脉炎的处理，错误的是
- A. 患肢抬高、制动 B. 局部冰袋冷敷 C. 局部 50%硫酸镁湿热敷
D. 超短波理疗 E. 如意黄金散加醋调成糊状外敷
23. 下列与睡眠无关的表现是
- A. 血压下降 B. 瞳孔散大 C. 呼吸变慢
D. 心率减慢 E. 尿量减少
24. 大量分泌生长激素，促进体力恢复，发生在睡眠的
- A. 第 I 期 B. 第 II 期 C. 第 III 期
D. 第 IV 期 E. REM 期
25. 医院感染的主要对象是
- A. 门诊患者 B. 急诊患者 C. 住院患者
D. 探视者 E. 陪护者
26. 以下不属于医院感染的是
- A. 新生儿肺炎 B. 新生儿脐炎 C. 新生儿腹泻
D. 新生儿败血症 E. 新生儿硬肿症
27. 关于医嘱种类的叙述下列不妥的是
- A. 长期医嘱有效时间在 24 小时以上 B. 长期备用医嘱两次执行之间有间隔时间
C. 临时医嘱有效时间在 12 小时以内 D. 临时备用医嘱仅在规定时间内有效
E. 长期医嘱由医生注明停止时间方为失效
28. 某胸腔手术后病人，胸腔闭式引流管不慎自胸壁伤口脱出，首要措施是
- A. 急呼医生处理 B. 将引流管重新插入胸腔
C. 手指捏紧引流口皮肤 D. 到换药室取凡士林纱布堵塞引流口
E. 急送手术室
29. 颅脑损伤病人意识障碍有中间清醒期，一侧瞳孔散大，对光反应消失，对侧肢体偏瘫，提示为
- A. 脑挫裂伤 B. 脑干损伤 C. 硬脑膜外血肿
D. 枕骨大孔疝 E. 脑内血肿
30. 一般冷疗时间，最长不得超过
- A. 20min B. 30min C. 40min
D. 50min E. 60min
31. 门静脉高压症患者，分流手术前护理哪项错误
- A. 卧床休息 B. 肌注维生素 K C. 应用护肝药物
D. 留置胃管 E. 高糖低脂高维生素饮食
32. 一般成人胃管插入深度为
- A. 20~30Cm B. 35~40Cm C. 45~55Cm
D. 50~60Cm E. 55~65Cm
33. 下列外文缩写正确的是
- A. 每日一次 qod B. 隔日一次 qd C. 每晚一次 biw
D. 每晨一次 qm E. 每周一次 qn
34. 臀大肌注射部位为

天任考研

- A. 髂前上棘与尾骨连线外上 1/2 处
B. 髂前上棘与尾骨连线内上 1/2 处
C. 髂前上棘与尾骨连线外上 1/3 处
D. 髂前上棘与尾骨连线内上 1/3 处
E. 髂前上棘与尾骨连线内下 1/3 处
35. 剧毒药及麻醉药的最主要保管原则是
A. 与内服药分别放置
B. 放阴凉处
C. 装密封瓶中保存
D. 应加锁并专人保管
E. 应有明显标签
36. 在超声波雾化器工作原理中，将电能转换为超声波声能的装置是
A. 超声波发生器
B. 雾化罐透声膜
C. 雾化罐过滤器
D. 晶体换能器
E. 电子管
37. 下呼吸道起于气管，止于
A. 支气管
B. 细支气管
C. 呼吸性细支气管末端
D. 肺泡
E. 气血屏障
38. 下列说法正确的是
A. 胸膜腔是由胸膜围成的半密闭腔室
B. 胸腔内压是指胸膜腔内的压力
C. 正常人呼气时胸腔内压高于大气压
D. 正常人呼气末时胸腔内压等于大气压
E. 正常人吸气末时胸腔内压等于大气压
39. 幽门梗阻患者手术前护理，下列哪项可减轻胃黏膜水肿有利于术后吻合口愈合
A. 纠正脱水
B. 纠正低氯低钾性碱中毒
C. 给予流质或禁食
D. 术前数日晚温等渗盐水洗胃
E. 加强营养
40. 呼吸中枢所在的位置是
A. 大脑
B. 小脑
C. 脑干
D. 脑桥
E. 延髓
41. 某患者食管癌手术后第 3 天，拔除胃管后进流质饮食，第 5 天体温高达 39°C，呼吸困难，胸痛，X 线胸透见有胸腔积液，首先考虑的并发症是
A. 吸入性肺炎
B. 膈下脓肿
C. 切口感染
D. 食管吻合口瘘
E. 支气管胸膜瘘
42. 急性上呼吸道感染最常见的致病微生物是
A. 细菌
B. 病毒
C. 支原体
D. 衣原体
E. 真菌
43. 细菌性咽-扁桃体炎最常见的致病菌是
A. 溶血性链球菌
B. 流感嗜血杆菌
C. 肺炎链球菌
D. 葡萄球菌
E. 革兰阴性杆菌
44. 急性气管—支气管炎最主要的病因是
A. 感染
B. 受凉
C. 过度劳累
D. 过敏反应
E. 理化因素
45. 下列选项中与哮喘的发病机制无关的是
A. 变态反应
B. 呼吸道炎症
C. 神经机制
D. 内分泌因素
E. 呼吸道高反应性

- 46.哮喘发作时血常规检查可见
- A.血小板总数升高 B.血小板总数降低 C.嗜酸性粒细胞升高
D.嗜碱性粒细胞升高 E.淋巴细胞升高
- 47.哮喘患者的痰液涂片中可见到较多的
- A.白细胞 B.脓细胞 C.淋巴细胞
D.嗜酸性粒细胞 E.嗜碱性粒细胞
- 48.脑出血患者急性期绝对卧床休息的时间为
- A.1~2周 B.1~3周 C.2~4周
D.1周 E.2周
- 49.男性,56岁,突然心悸,气促,咯粉红色泡沫痰,血压180/90mmHg,心率136次/分,首先应给予的抢救药物是
- A.西地兰、硝酸甘油、异丙肾上腺素 B.硝普钠、西地兰,速尿
C.毒毛花苷K,硝普钠、心得安 D.肌乙啶、酚妥拉明、西地兰
E.硝酸甘油、西地兰、多巴胺
- 50.下列不属于支气管扩张发病因素的是
- A.肺炎球菌肺炎 B.支原体肺炎 C.麻疹肺炎
D.肺结核 E.吸烟
- 51.社区获得性肺炎中最常见的是
- A.肺炎球菌肺炎 B.支原体肺炎 C.军团菌肺炎
D.衣原体肺炎 E.革兰阴性杆菌肺炎
- 52.结核菌主要的传播途径为
- A.呼吸道 B.消化道 C.泌尿道
D.生殖道 E.破损的皮肤.黏膜
- 53.胃十二指肠溃疡急性穿孔,非手术治疗中,哪项最重要
- A.安静卧床,取半卧位 B.禁食.补液 C.应用抗生素
D.给予胃肠减压 E.禁用镇静止痛剂
- 54.胃大部切除术后四天,病人发生不含胆汁的频繁呕吐,可能是
- A.胃肠吻合口炎症水肿 B.近侧空肠段梗阻 C.远侧空肠段梗阻
D.倾倒综合征 E.低钾血症
- 55.肺脓肿的主要病原体是
- A.细菌 B.病毒 C.支原体
D.衣原体 E.真菌
- 56.择期手术后1~2天,体温38°C,最可能的原因是
- A.手术切口感染 B.上呼吸道感染 C.伴发肺部感染
D.基础代谢增高 E.组织吸收反应
- 57.联合使用抗结核药物的主要优点是
- A.减少毒副作用 B.减少病菌传播 C.增强药物浓度
D.防治耐药菌株 E.长期保持有效浓度
- 58.肺脓肿治疗的关键是

- A.适当休息 B.加强营养 C.处理原发病灶
D.支持和对症治疗 E.抗菌和痰液引流
- 59.支气管肺癌早期最常见的症状是
A.经常发热 B.明显消瘦 C.反复咯血
D.呼吸困难 E.刺激性干咳
- 60.自发性气胸典型的临床症状是
A.咳嗽, 咳痰、咯血 B.胸痛、干咳、咯血 C.咳痰、咯血、呼吸困难
D.胸痛、干咳、呼吸困难 E.伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- 61.再生障碍性贫血患者必须绝对卧床休息的指征是血小板数低于
A. $50 \times 10^9/L$ B. $60 \times 10^9/L$ C. $40 \times 10^9/L$
D. $20 \times 10^9/L$ E. $10 \times 10^9/L$
- 62.呼吸衰竭的缺氧典型表现是
A.呼吸困难 B.发绀 C.精神症状
D.循环系统症状 E.消化系统症状
- 63.急性白血病患者检出染色体结构异常, t(15, 17)最可能是哪种白血病
A.CML B.ALL C.AML-M4
D.AML-M2 E.AML-M3
- 64.在心尖区触及舒张期震颤可见于
A.主动脉瓣狭窄 B.肺动脉瓣狭窄 C.二尖瓣狭窄
D.动脉导管未闭 E.二尖瓣关闭不全
- 65.发生生理性心悸常见于
A.激动 B.贫血 C.高热
D.甲状腺功能亢进 E.心力衰竭
- 66.对心力衰竭患者护理的重要措施是
A.合理吸氧 B.消除焦虑 C.健康教育
D.减轻心脏的负荷 E.预防并发症发生
- 67.急性肾盂肾炎病人不会出现的实验室检查结果是
A.血尿 B.脓尿 C.大量蛋白尿
D.管型尿 E.菌尿
- 68.学生刘某, 男性, 18岁。篮球比赛时不慎踝部扭伤, 应立即给予
A.局部按摩 B.局部冷湿敷 C.红外线照射
D.放置热水袋 E.松节油涂擦
- 69.当一患者骶尾部皮肤破溃, 显露红润创面, 并有脓性分泌物, 此属于压疮哪一期
A.炎性浸润期 B.瘀血红润期 C.坏死溃疡期
D.组织坏死期 E.浅度溃疡期
- 70.经皮穿刺腔内冠状动脉成形术的禁忌证是
A.急性心肌梗死 B.不稳定型心绞痛 C.冠状动脉近端狭窄
D.冠状动脉远端狭窄 E.冠状动脉僵硬
- 71.非同步电复律用于治疗

- A.心室扑动 B.室性心动过速 C.心房扑动
D.室上性心动过速 E.心房颤动

72.下列搬运法正确的是

- A.轮椅是护送不能起床的患者 B.平车是护送不能行走的患者
C.腰椎骨折需四人搬运 D.病情重、体重轻的可一人搬运
E.颈椎骨折必须三人搬运

73.下列有关心脏起搏器安置术后的护理措施及有关的指导中，不正确的是

- A.心电监护 24h B.右侧卧位 4d C.限制活动 6 周
D.术后第 2d 协助患者做术侧局部活动 E.不宜使用挎肩背包

74.患者，女，53 岁。患“幽门管溃疡”1 个月，现原有疼痛节律消失，出现餐后上腹部饱胀，频繁呕吐宿食，最可能的并发症为

- A.穿孔 B.癌变 C.出血
D.幽门梗阻 E.慢性胃肠炎

75.接受降压药物治疗的高血压患者，起床时晕倒，片刻后清醒，首先考虑是

- A.心源性休克 B.高血压危象 C.高血压脑病
D.急性左心衰竭 E.体位性低血压

76.关于自身免疫性胃炎，正确的是

- A.病变部位在胃窦部 B.在我国发病率较高 C.相当于以往命名的 B 型胃炎
D.可出现恶性贫血 E.主要原因是幽门螺杆菌感染

77.给心力衰竭患者输液，应严格限制滴速在

- A.10~19 滴/min B.20~30 滴/min C.31~40 滴/min
D.41~50 滴/min E.61~70 滴/min

78.心室颤动的脉搏特征是

- A.快而规则 B.慢而规则 C.快而不规则
D.慢而不规则 E.消失摸不到

79.以减轻心脏前负荷为主的药物是

- A.多巴胺 B.硝酸甘油 C.洋地黄
D.呋塞米 E.朋屈嗪

80.转复心房扑动最有效的办法是

- A.药物治疗 B.心脏按压 C.人工呼吸
D.同步直流电 E.非同步直流电

81.无盐低钠饮食原则下列错误的是

- A.必须控制食物中自然存在的钠含量 B.禁用腌制品
C.禁用含钠食物和药物 D.每天控制食物中钠含量<0.7g
E.适用于重度高血压水肿较重患者

82.治疗非器质性心脏病的窦性心动过速，最好的药物是

- A.洋地黄 B.奎尼丁 C.普萘洛尔
D.美西律 E.维拉帕米

83.风湿热的主要临床表现是

- A.低热或不规则中度热 B.乏力、纳差 C.心肌炎、关节炎、皮肤损害、舞蹈症
D.红细胞沉降率增快 E.关节痛
- 84.二尖瓣狭窄最常见的早期症状是
A.呼吸困难 B.咳嗽、咯血 C.粉红色泡沫痰
D.肝瘀血 E.声音嘶哑
- 85.代谢性酸中毒的临床表现是
A.呼吸浅而慢 B.呼吸深而快 C.血二氧化碳结合力升高
D.尿呈碱性 E.血 pH 升高
- 86.休克患者微循环衰竭期的典型临床表现是
A.表情淡漠 B.皮肤苍白 C.尿量减少
D.血压下降 E.全身广泛出血
- 87.休克时血压和中心静脉压都低，应采取的措施是
A.应用扩张血管药 B.应用缩血管药 C.加速扩容
D.强心 E.纠正酸中毒
- 88.对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是
A.血气分析 B.X 线检查 C.心电图检测
D.呼吸功能检测 E.血流动力学监测
- 89.急性呼吸窘迫综合征的最基本的病理改变是
A.低氧血症 B.酸中毒 C.肺泡内及间质水肿
D.血管通透性增高 E.肺泡表面活性物质缺失
- 90.硬膜外麻醉最严重的并发症是
A.血压下降 B.血管扩张 C.尿潴留
D.全脊髓麻醉 E.呼吸变慢
- 91.急性胰腺炎腹痛明显者需禁食、禁水多少时间为宜
A.1~3 小时 B.6~12 小时 C.12~36 小时
D.1~3 天 E.1~3 周
- 92.下列有关心脏复跳后应用低温疗法，错误的做法是
A.头部重点降温 B.尽早开始降温 C.直肠温度降至 32℃ 维持 24h
D.控制寒战和抽搐 E.严格控制输液量
- 93.患者心肺复苏后，脑复苏的主要措施是
A.维持有效的循环 B.确保呼吸道通畅 C.降温和脱水疗法
D.加强基础护理 E.治疗原发疾病
- 94.可出现平均肺动脉压降低的是
A.肺血管阻力升高 B.二尖瓣狭窄 C.肺动脉狭窄
D.左心功能不全 E.肺血流量增加
- 95.对中心静脉压和血压均低于正常值的休克患者，应采取的措施是
A.大量输液，加快滴速 B.控制滴速，减慢输液 C.暂停输液，用强心剂
D.用升压药物 E.用扩血管药物

- 96.关于术后各种引流管的观察护理，最重要的是
- 换药时应注意引流管体外部位的固定
 - 胃肠减压管，引流量少时应考虑位置或有否堵塞
 - 保持引流管通畅，防止阻塞、扭曲
 - 仔细观察引流物的流量和颜色变化
 - 烟卷式引流，渗液较多，需要 4~7d 才能拔除
- 97.术后采取的卧位中哪项不妥
- 术后全麻患者去枕平卧，头向一侧
 - 颈部术后取仰卧位
 - 胸、腹术后取 30° ~45° 半卧位
 - 脊柱术后一般平卧于硬板床
 - 颅脑术后可取头高斜坡卧位
- 98.下列疼痛测量和评估方法中，常用并敏感的是
- 口述分级评分法
 - 行为疼痛测定法
 - 数字评分法
 - 视觉模拟评分法
 - 术后疼痛的 Prince-Henry 法
- 99.关于痛阈正确的是
- 忧虑可提高痛阈
 - 儿童的疼痛阈值高于成年人
 - 儿童的疼痛阈值明显低于成年人
 - 有兴趣的活动可降低痛阈
 - 优美的环境可降低痛阈
- 100.关于饥饿初期时的机体代谢变化下述哪一项是主要的
- 机体的代谢率降低
 - 机体组织此时均利用脂肪氧化供能
 - 初期蛋白质分解增加，几天后分解减少
 - 糖原分解加强
 - 蛋白质分解释出的氨基酸经糖异生作用生成葡萄糖
- 101.通过中心静脉途径进行肠外营养支持的患者，估计其接受营养支持的时间至少应为
- 1 周
 - 2 周
 - 3 周
 - 4 周
 - 5 周
- 102.溶血性链球菌感染所形成的脓液为
- 黏稠无臭
 - 黏稠恶臭
 - 稀薄量多无臭
 - 黏稠黄色无臭
 - 稀薄棕色，恶臭
- 103.口底、颌下和颈部患蜂窝组织炎时，护士应特别警惕患者是否并发了
- 菌血症
 - 喉头水肿
 - 海绵状静脉窦炎
 - 脓毒败血症
 - 吞咽困难
- 104.热烧伤的病理改变主要取决于
- 热源类型及受热时间
 - 热源温度及受伤部位
 - 受热时间及受伤面积
 - 热源温度及受热时间
 - 热源温度及受伤面积
- 105.中国第一所临终关怀医院—南汇护理院诞生于
- 1991 年 3 月
 - 1993 年 5 月
 - 1976 年 12 月
 - 1988 年 5 月
 - 1988 年 10 月
- 106.急性肾功能衰竭高钾血症的发生不受下列哪个因素影响
- 感染
 - 酸中毒
 - 水钠潴留
 - 输入库存血
 - 外伤

107.肾移植后最常见的病毒感染是

- A.EB 病毒 B.CMV 病毒 C.HIV 病毒
D.水痘一带状疱疹病毒 E.单纯疱疹病毒

108.对放射线高度敏感的肿瘤是

- A.来自上皮的恶性肿瘤 B.淋巴造血系统和某些胚胎组织的恶性肿瘤
C.软组织恶性肿瘤 D.骨组织恶性肿瘤 E.黑色素瘤

109.恶性肿瘤化疗时应掌握的原则不包括

- A.诊断必须明确 B.有手术指征不可错过手术时机
C.注意不良反应 D.每周查白细胞
E.白细胞在 $0.4 \times 10^9/L$ 以下时应停药

110.下列关于甲亢患者循环系统临床表现中正确的是

- A.脉搏慢而弱 B.第一心音减弱 C.心搏出量减少
D.周围血管收缩，脉压减小 E.休息时脉率大于 100 次/min

111.下列关于碘剂的叙述正确的是

- A.突出的副作用是白细胞和粒细胞减少 B.抑制甲状腺素的释放
C.使腺体肿大、充血 D.甲亢患者术前服用 1 周即可手术
E.对消化道黏膜无刺激

112.女性 41 岁，因头部外伤后昏迷 10 分钟，苏醒后又再次昏迷。检查见左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。病情判断为

- A.帽状腱膜下血肿 B.硬脑膜下血肿 C.脑内血肿
D.硬脑膜外血肿 E.颅骨骨膜下血肿

113.乳腺癌术后观察到患侧皮肤呈青紫色伴皮肤温度降低、脉搏不能扪及，提示

- A.皮瓣下出血 B.腋部血管受压 C.引流管堵塞
D.胸带加压包扎过松 E.伤口感染

114.疝内容物被嵌顿时间较久，发生血液循环障碍而坏死称为

- A.难复性疝 B.嵌顿性疝 C.绞窄性疝
D.易复性疝 E.滑动性疝

115.心脏自身的血液供应主要来源于

- A.主动脉 B.锁骨下动脉 C.冠状动脉
D.肺动脉 E.肺静脉

116.关于膈下脓肿，下列错误的是

- A.位于膈以下，横结肠及其系膜之上 B.全身中毒症状轻，局部表现重
C.患侧上腹持续性钝痛、叩击痛 D.X 线见膈肌抬高
E.B 超有助于诊断

117.原发性腹膜炎最常见的致病菌是

- A.大肠杆菌 B.溶血性链球菌 C.铜绿假单胞菌
D.金黄色葡萄球菌 E.破伤风杆菌

118.对胃肠破裂有重要意义的检查是

- A.腹穿抽出血性液 B.腹部叩诊鼓音 C.X 线透视膈下游离气体

D.腹膜刺激征明显 E.腹膜刺激征较轻

119.实质性脏器破裂腹腔内不凝积血的主要原因是

A.血液被腹膜渗液稀释 B.凝血因子生成障碍 C.凝血酶原降低
D.出血量大 E.腹膜的脱纤维作用

120.瘢痕性幽门梗阻的典型症状是

A.恶心、暖气.食欲减退 B.经常呕吐 C.上腹部疼痛
D.代谢性酸中毒体征 E.上腹部闷胀感

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选，错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.下呼吸道感染的常见因素为

A.免疫功能受损 B.正常菌群失调 C.病原体的飞沫传
D.空调系统污染 E.致病菌通过气道逆行感染

2.护理人员在健康保健事业中的作用是

A.开展社区护理 B.为危、急.重症患者提供高技术整体护理
C.提供健康教育和指导 D.预防性服务
E.预防和控制地方性流行病

3.下列有关艾瑞克森心理社会发展理论的陈述，正确的是

A.文化及社会环境在人格发展中起重要作用
B.心理社会发展阶段的顺序固定，不能颠倒
C.每个心理社会发展阶段均有一个发展危机要解决
D.并非每个人都必须经历 8 个心理社会发展阶段
E.前一阶段未解决的发展危机，可到下一阶段顺利解决

4.水污染对人体健康的影响主要有

A.引起急性或慢性中毒 B.致癌、致畸、致突变作用
C.以水为媒介的传染病 D.对水生生态系统的危害
E.造成水资源紧张

5.以下哪些表现为压疮第三期的临床表现

A.局部皮肤出现红，肿、热、痛 B.局部皮肤呈紫红色
C.局部皮肤形成水疱 D.真皮层有黄色渗出液
E.表皮水疱扩大，破溃

6.输血可引起哪些感染

A.梅毒 B.丙型病毒性肝炎 C.弓形虫病
D.艾滋病 E.巨细胞病毒感染

7.细菌合成的产物有

A.热原质 B.毒素 C.抗生素
D.色素 E.维生素

8.抗菌药物的不合理应用表现在诸多方面

A.无指征的预防用药 B.无指征的治疗用药 C.抗菌药物品种、剂量的选择错误
D.给药途径、给药次数不合理 E.疗程不合理

9.低张性缺氧常见于

- A.高山病 B.先天性心脏病 C.心力衰竭
D.一氧化碳中毒 E.慢性阻塞性肺部疾病

10.肺循环的特点包括

- A.低压力 B.低阻力 C.低容量
D.毛细血管丰富 E.肺动脉携带脱氧血

11.预防肺结核传播的措施有

- A.新生儿接种卡介苗 B.隔离排菌结核患者 C.加强营养，锻炼身体，增强抵抗力
D.合理化疗治愈排菌患者 E.为密切接触排菌患者的易感者预防投药

12.抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制定包括

- A.选用品种 B.剂量 C.给药次数
D.给药途径、疗程 E.联合用药

13.引起性病的病原体有

- A.淋病奈瑟菌 B.梅毒螺旋体 C.艾滋病病毒
D.衣原体 E.支原体

14.下列哪些因素可诱发支气管哮喘

- A.真菌 B.羽绒被 C.接触刺激性气体
D.过量运动 E.口服阿司匹林

15.患者，男，45岁，反复咳嗽，咳脓痰10余年，少量咯血，痰量约为40ml/d，黏稠，以“左下肺支气管扩张”诊断入院。以下处理不恰当的是

- A.指导患者取右侧卧位 B.嘱患者尽量控制咳嗽 C.鼓励经常活动及进行体位更换
D.鼓励患者多饮水，每天1500ml以上 E.施行体位引流

16.呼吸衰竭进行氧疗时，应注意

- A.根据病因、类型不同，氧疗指征及给氧方法不同
B.对单纯缺氧患者，可尽快纠正低氧血症
C.有二氧化碳潴留患者，予以低流量吸氧
D.所有呼吸衰竭患者，氧浓度需控制在50%左右
E.首选面罩方法给氧

17.对支气管扩张患者保持口腔清洁的目的是

- A.利于排痰 B.减少口腔感染 C.减少咯血机会
D.增进食欲 E.减少痰量

18.肺癌局部扩散引起的临床表现有

- A.胸痛 B.呼吸困难 C.咽下困难
D.声音嘶哑 E.上腔静脉阻塞综合征

19.慢性肺心病的发病机制中，引起肺动脉高压的因素包括

- A.缺氧 B.高碳酸血症 C.血液黏稠度增加
D.COPD反复发作 E.血容量减少

20.哮喘严重持续时常用而有效的祛痰方法是

- A.鼓励患者多饮水 B.气管插管吸痰 C.应用大量糖皮质激素

- D.补液、纠正失水 E.祛痰剂口服
- 21.喉头梗阻可有那些原因引起
 A.急性喉炎 B.喉、气管异物 C.喉外伤
 D.喉部肿瘤 E.过敏性疾病
- 22.高钾血症的心电图改变是
 A.PR 间期缩短 B.QT 间期延长 C.出现 U 波
 D.ST 段降低 E.T 波高尖
- 23.等渗性缺水的处理原则为
 A.消除原发病因 B.防止或减少水和钠的继续丧失
 C.防止血液浓缩 D.补充血清氯
 E.用等渗盐水或平衡盐溶液补充血容量
- 24.休克代偿期的微循环变化是
 A.微动脉、微静脉收缩 B.动静脉短路开放 C.静脉回心血量增加
 D.组织灌注量减少 E.微动脉扩张，微静脉收缩
- 25.中心静脉压测定可以反映
 A.左心房压力 B.右心房压力 C.肺循环压力
 D.胸腔内腔静脉压力 E.左心室压力
- 26.可作为急性肾衰竭患者少尿期输液量是否适当的评价指标是
 A.体重每日减轻 0.5kg B.CVP 在正常水平 C.血钾恢复正常
 D.无呼吸困难肺水肿 E.血钠维持在 130mmol/L 以上
- 27.急性呼吸窘迫综合征患者采用呼气末正压通气的目的是
 A.增加肺泡血流量 B.增加肺泡通气量 C.纠正低氧血症
 D.使肺泡复张 E.促进肺间质水肿消退
- 28.弥散性血管内凝血不可缺少的化验有
 A.血小板计数 B.纤维蛋白原定量 C.凝血酶原时间
 D.红细胞比容测定 E.鱼精蛋白副凝试验
- 29.局麻药毒性反应易患因素包括
 A.药量过小 B.药液浓度过高 C.药液不慎注入血管
 D.局部组织血液循环丰富E.患者耐受力低
- 30.与硬膜外麻醉相比，蛛网膜下腔麻醉的特点是
 A.并发症较多 B.多用于上腹部手术 C.可发生麻醉后头痛
 D.只用于较短时间的手术 E.有发生全脊椎麻醉的危险

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

（一）患者李女士，身高 158cm，体重 70kg，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。

- 1.病房护士为患者安置的体位是
 A.仰卧屈膝位 6h B.去枕平卧 6h C.侧卧位 6h
 D.中凹卧位 6h E.仰卧位 6h
- 2.术后第二天患者体温 38.2℃，并诉切口疼痛，此时护士为患者安置的体位是

- A.右侧卧位 B.仰卧屈膝位 C.头高足低位
D.端坐位 E.半坐卧位

3.为患者安置该体位时，应向患者及家属解释此卧位的目的是

- A.可减少局部出血，利于切口愈合
B.有利于减少回心血量，减轻心脏负担
C.有利于减轻肺部瘀血，减少肺部并发症
D.有利于防止炎症扩散和毒素吸收，并可减轻切口缝合处的张力，减轻疼痛
E.有利于增进食欲，为进食作准备

(二)患者，男，25岁，因发热、纳差7d入院，查

体温 39.50℃，脉搏 70 次/min，肝肋下 2Cm，脾肋下 2.5Cm，血常规 WBC $3.2\times 10^9/L$ ，中性粒细胞 45%，淋巴细胞 55%，诊断考虑为伤寒。1.该患者病原治疗的首选药物是

- A.喹诺酮类 B.磺胺密啶 C.利巴韦林（病毒唑）
D.头孢霉素 E.氯霉素

2.目前患者正处于病程的

- A.初期 B.极期 C.缓解期
D.反应期 E.恢复期

3.此期伤寒患者不会出现的是

- A.表情淡漠 B.听力减退 C.玫瑰疹
D.稽留热 E.再燃

4.入院第 4d，患者突然出现剧烈腹痛。体检：腹肌紧张，明显压痛、反跳痛。考虑最可能的原因是

- A.肠出血 B.肠穿孔 C.肠痉挛
D.脾脏破裂 E.急性阑尾炎

(三)某男性老年患者，慢性咳嗽咳痰 10 年，近两年来劳动时出现气短，近 2d 感冒后病情加重，咳脓痰且不易咳出。体检：体温为 36.7℃，神志清，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音低，以“慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺气肿”入院治疗。

1.患者目前最主要的护理诊断是

- A.体液过多 B.有感染的危险 C.清理呼吸道无效
D.体温过高 E.自理缺陷

2.患者目前最主要的治疗措施是

- A.抗生素控制感染 B.应用镇咳药 C.给予吸氧
D.进行缩唇腹式呼吸训练E.使用支气管扩张剂

3.患者应给予的氧疗方式为

- A.间歇给氧 B.酒精湿化给氧 C.低浓度持续给氧
D.高压给氧 E.高浓度持续给氧